

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Youm 7
DATE:	31-October-2015
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	150,000
TITLE :	MoH completes its survey of HBV and HCV infection incidence
PAGE:	06
ARTICLE TYPE:	MoH News
REPORTER:	Waleed Abdel Salam

«الصحة» تنتهي من الكشف عن انتشار فيروسى C وB

الإصابة فى الأشخاص من سن 1 إلى 59 سنة بلغت 4.4% ومن 15 إلى 59 سنة 7.%

كتب - وليد عبد السلام

انتهت وزارة الصحة من المسح السكاني الخاص بالكشف عن معدلات انتشار فيروسى C وB فى مصر، على أن يتم الإعلان عنه خلال الأسابيع المقبلة.

وقال الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان: إن معدل انتشار فيروس سى بين المصريين فى الفئة العمرية من سنة إلى 59 سنة بلغ 4.4% بينما معدل انتشار فيروس بى فى الفئة العمرية من سنة إلى 59 سنة بلغ 1.1%، مؤكداً أن المسح تم إجراؤه على 26 ألف شخص من مختلف الفئات العمرية فى 25 محافظة بالجمهورية، مشيراً إلى أن معدل الإصابة بفيروس سى بين الفئة العمرية من سن 15 إلى 59 سنة بلغ 7% بينما كانت نتيجة المسح فى نفس الفئة العمرية عام 2008 بلغت 9.8% وهو ما يعنى انخفاض 2.8% فى معدلات الإصابة، وأن نتيجة جهودات الوزارة الكبيرة فى مجال مكافحة فيروس سى انخفضت نسبة الإصابة بفيروس سى لعدة أسباب، أهمها مكافحة العدوى

فى المستشفيات، بالإضافة إلى رفع أمان وسلامة الدم مع توفير العلاجات المناسبة مثل الإنترفيرون والريبافيرين.

وأن نسبة الالتزام بمعايير مكافحة العدوى فى المستشفيات ارتفعت من 19 لـ 68% فى المسح السكانى الجديد، مشيراً إلى أن أمان وسلامة أكياس الدم فى خلوها من أمراض الفيروسات الكبدية ساهم فى خفض معدلات الإصابة بفيروس سى.

وتابع: إن عامل التوعية من أهم العوامل التى ساهمت فى خفض الإصابة بفيروس سى بنسبة 2.8% خلال الـ 7 سنوات الماضية.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية تُعتبر الأحداث السلبية الأكثر تواتراً، التى تهدد سلامة المرضى فى جميع أنحاء العالم. إن حوالى 5% إلى 15% من المرضى المقبولين فى مستشفيات العناية الفائقة فى البلدان المتقدمة يكتسبون عدوى مرتبطة بالرعاية الصحية فى أى وقت من الأوقات، وخطر اكتساب عدوى فى البلدان النامية يعد أعلى بـ 2 إلى 20 ضعفاً.



عماد