


PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Akhbar Al Massai
DATE:	27-October-2015
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	150,000
TITLE :	Breast cancer can affect men as well
PAGE:	07
ARTICLE TYPE:	NGO News
REPORTER:	Doaa Zakaria

سرطان الثدي قد يصيب الرجال أيضاً

أصيب في الماضي من التشخيص في الثدي نتيجة لأخذ علاجات هرمونية، كما أيضاً الرجال الذين أصيبوا بأمراض في الثدي. بالإضافة إلى أمراض الخصيتين كالتكاثر أو اختفاء الخصية كلها احتمالات تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي للرجل وعن أعراض سرطان الثدي للرجل يؤكد شعلان أنها مشابهة لأعراض سرطان الثدي للنساء وهي وجود كتلة في منطقة الثدي أو نزيف من الحلمة أو تغير في الجلد في المنطقة الموجودة فوق الوريد السطحي يتم تشخيص الموجودة فوق الوريد السطحي المتبعة لدى النساء وهي أشعة الماموجرام على الثدي. وأخذ عينة من من أنسجة الثدي وفحصها ثم العلاج الكيميائي وبعد الإشعاعي وانتهاء بالعلاج الهرموني في النهاية يحد شعلان على ضرورة الاكتشاف المبكر ودوره في سرعة الشفاء من سرطان الثدي عند السيدات وعند الرجال أيضاً فيمنح شعلان بأهمية الفحص الذاتي للرجل شهرياً.



أطلقت المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها حملة في شهر التوعية بسرطان الثدي تحت عنوان «الشريط الأزرق للرجل» هدفها رفع الوعي بسرطان الثدي للرجال وغير المتعارف لدى كثير من الناس أن سرطان الثدي كما يصيب المرأة فمن الممكن أن يصيب الرجل، وتعد نسبة الرجال الذين لا يعرفون إمكانية إصابتهم بالمرض ٦٥٪ أما النسبة ٣٥٪ الباقون فلا يتخذون الإجراءات اللازمة للوقاية من المرض من جانبه قال دكتور محمد شعلان أستاذ جراحة الأورام بالمعهد القومي للأورام ورئيس المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي إنه على الرغم من أن مرض سرطان الثدي متعارف عليه بأنه يصيب النساء إلا أنه قد يصيب الرجال الذين يتواجد عندهم عدد من أنسجة الثدي التي من الممكن أن تنمو بداخلها خلايا سرطانية وتصيب سرطان الثدي. ويضيف تعد نسبة الإصابة بسرطان الثدي للرجال ضئيلة جداً مقارنة بإصابة النساء به فيصاب به رجل واحد فقط من بين ١٠ ملايين رجل وبمعدل حالة إصابة رجل أمام ١٣٥ حالة إصابة امرأة.

بعد المرض أكثر خطورة عند الرجال منه عند النساء. ويشير شعلان إلى تعدد عوامل إصابة الرجل بسرطان الثدي ومنها إذا كان

توافر التوعية الكافية للرجال لمرض سرطان الثدي مما يؤدي للاكتشاف المتأخر للمرض وأحياناً في حالته المتقدمة ولهذا السبب

بأنه عامل مؤثر للإصابة بسرطان الثدي للتساءل ويتم اكتشاف المرض لدى الرجال من سن ٦٠ لـ ٧٠ عاماً ويرجع ذلك لعدم

ويرجع لقلة كمية أنسجة الثدي للرجال وبالتالي تتركز كمية أقل من الهرمونات خاصة هرمون (الإستروجين) المعروف