

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Rose El Youssef
DATE:	25-October-2015
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	40,000
TITLE :	Study: 7.5 million diabetes patients in Egypt
PAGE:	Back page
ARTICLE TYPE:	NGO News
REPORTER:	Hassan Abdel Zahar

دراسة: 7.5 مليون مصاب بمرض السكر في مصر

كتب: حسن عبدالظاهر

ناقش مؤتمر الجمعية العربية لدراسة أمراض السكر والميتابوليزم السنوى العاشر الذى عقد أمس أحدث الدراسات فيما يتعلق بأسباب ومخاطر وطرق تقادى انخفاض مستوى السكر فى الدم لدى المصابين بمرض السكر. فقد كشفت الدراسات أن انخفاض مستوى السكر فى الدم يحدث عندما يتناول مريض السكر جرعات خاطئة من علاجهم أو عند أخذ جرعة الأنسولين فى التوقيت الخاطئ أو عدم تناول الطعام فى الأوقات المناسبة أو أخذ الجرعة فى مكان خاطئ أو بطريقة خاطئة. ومن الضروري استشارة الأطباء فيما يتعلق بأفضل الطرق للتعامل مع انخفاض مستوى السكر فى الدم، حيث تشير إحدى الدراسات لقيام ١٥٪ فقط من مريض السكر من النوع الثانى بالتحدث مع طبيبيهم عن إصابتهم بنقص مستوى السكر فى الدم، ويقوم ٤٢٪ من مريض السكر من النوع الثانى بتعديل جرعة الأنسولين الخاصة بهم عند شعورهم بنوبة غير شديدة من نقص مستوى السكر فى الدم، بينما يقوم ٧٤٪ من مريض السكر من النوع الأول بتعديل جرعة الأنسولين الخاصة بهم بعد شعورهم بنوبة شديدة من انخفاض السكر فى الدم.

وتعليقا على نتائج الدراسات، قالت د. إيناس شلتوت، رئيس الجمعية العربية لدراسة أمراض السكر والميتابوليزم وعضو الاتحاد العالمى لمرض السكر خلال المؤتمر الصحفى «أنه يوجد فى مصر ٧,٥ مليون شخص مصاب بمرض السكر، ومن المتوقع أن يصل عدد المصابين به إلى ١٢ مليون شخص بحلول عام ٢٠٢٠».