

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Ahram
DATE:	8-February-2015
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	1,500,000
TITLE :	68 million Diabetes Patients in the Arab World by 2035
PAGE:	22
ARTICLE TYPE:	NGO News
REPORTER:	Mona Harek

٦٨ مليون مريض بالسكر في العالم العربي بحلول عام ٢٠٣٥

دبي من : منى حرك

مراقبة للجرعات أو تعديلها أثناء علاج مرضى النوع الثاني من السكر المصابين بالفشل الكلوي أو الكبد، بالإضافة إلى أنها تؤدي إلى انخفاض كبير في مستوى السكر بالدم. وأشار إلى أن النوع الثاني من مرض السكر هو الأكثر شيوعاً، إذ يؤدي -في كثير من الحالات- إلى حدوث مضاعفات مزمنة تشمل الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض الكلى والكبد، والإصابة بالعمى.

ومن جانبه، يقول د. سعود السفري رئيس قسم الأمراض الباطنية ومدير مركز السكر في المملكة العربية السعودية إن هناك أدوية جديدة تتميز بإمكان إخراجها بشكل رئيسي عبر الصفراء والقناة الهضمية، وليس عبر الإخراج. وتتيح هذه الميزة استخدام الدواء حتى في الحالات التي يعاني فيها المرضى من الفشل الكلوي أو الكبد.

المساعدة في التعامل مع النوع الثاني من مرض السكر. وكشفت الجلسة -التي تضمنت شرحاً لواقع النوع الثاني من داء السكر- عن النتائج الأولية للدراسة الاستقصائية العالمية حول أهمية التواصل والحوار بين الطبيب والمريض في المراحل المبكرة من الإصابة حيث يواجه المصابون بالسكر مجموعة كبيرة من التحديات تتمثل في ضرورة تناول أدوية جديدة، وتغيير نمط حياتهم اليومية، الذي من شأنه أن يؤدي إلى الشعور بالضيق والاضطرابات النفسية.

من جهته، يقول د. عبد الرزاق المدني استشاري الغدد الصماء ورئيس جمعية الإمارات للسكر إن هناك علاجات جديدة تساعد على ضبط معدلات السكر في الدم تتميز باستخدام مثبطات إنزيم الببتيداز ثنائي الببتيد بخصائص فريدة تتعلق بالإخراج غير الكلوي. وأوضح أنها لا تتطلب أي

حذرت جلسة علمية ضمن فعاليات المؤتمر الثالث للسكر في الشرق الأوسط بمعرض الصحة العربي ٢٠١٥ بدبي، من ارتفاع معدلات الإصابة بالسكر في المنطقة العربية حيث أصبح السبب الثالث لوفاة البشر على مستوى العالم. وحسب الأرقام التي طرحها المشاركون في الجلسة فهناك حالة وفاة كل ٦ ثوان بسبب هذا المرض الذي يصيب أكثر من ٣٨٢ مليون مريض كما يتم إنفاق ٦١٢ مليار دولار سنوياً من ميزانيات الدول على علاج المرض ومضاعفاته.

وعلى مستوى العالم العربي يبلغ عدد المصابين نحو ٣٦.٨ مليون نسمة ويتوقع الخبراء أن يرتفع عدد المصابين بالمرض بحلول عام ٢٠٣٥ إلى ٦٨ مليون مريض، مشددين على ضرورة اتباع نظم علاجية آمنة وفعالة، وتعزيز الحوار بين الطبيب والمريض في المراحل المبكرة من الإصابة كأحد أهم العوامل