

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Massaeya
DATE:	9-February-2015
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	150,000
TITLE :	At Multiple Sclerosis Conference: MS Is the 2 nd Biggest Cause of Motor Disability in Youth after Car Accidents
PAGE:	12
ARTICLE TYPE:	NGO News
REPORTER:	Staff Report

فى مؤتمر التصلب المتعدد مرض «إم إس» ثانى أسباب إعاقة الشباب حركياً بعد حوادث السيارات



أكدت الدكتورة سامية عاشور أستاذ ورئيس قسم المخ والأعصاب بجامعة عين شمس إصابة ٤٠ ألف مريض فى مصر بمرض التصلب المتعدد، مؤكدة حرص جامعة عين شمس على متابعة تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة للمرضى غير القادرين الذين يتابعون العلاج مع الوحدة، مشيرة إلى أن هذه القرارات تتضمن تخصيص مبلغ يتراوح بين ٢٠٠٠ إلى ٣٠٠٠ جنيه لهؤلاء المرضى خلال فترة من ٦٢-٦٣ شهر وأوضحت أن هذا المبلغ ضئيل جداً وغير كاف نظراً لعدم قدرة المريض على دفع المبلغ المتبقى حيث يصل ثمن الدواء إلى حوالي ٤٠٠٠ جنيه مما يدفعهم للتوقف عن العلاج. جاء ذلك خلال المؤتمر السنوى الأول الذى أطلقته وحدة التصلب المتعدد بجامعة عين شمس لمناقشة مستقبل علاج مرضى إم أس فى مصر.

ووجهت د. سامية رسالة إلى وزارة الصحة ممثلة فى العلاج على نفقة الدولة وهيئة التأمين الصحي التي تتحمل أيضاً نصف ثمن العلاج للمرضى التابعين لها، وناشدتها بمراجعة ميزانية دعم المرضى غير القادرين، ورفع المبلغ المخصص حالياً لتمكينهم من الحصول على الدواء، إذ يعاني هؤلاء المرضى خلال رحلة علاجهم من آلام جسدية ونفسية كثيرة، فأقل ما

دون الانتقال إلى المراحل الأكثر تقدماً مع العلم أن معظم حالات التصلب المتعدد تصيب الشباب في المراحل العمرية المبكرة، مما يؤكد أهمية علاج هؤلاء الشباب ليكون لديهم القدرة على العمل والإنتاج، وبالتالي ترتفع الطاقة الإنتاجية وتحقق أرباحاً تتجاوز تكاليف العلاج. وأضاف: جميع علاجات إم أس متوفرة فى مصر ويتم تشخيص كل مريض بصورة منفردة لمعرفة كيفية الاستفادة من كل نوع من أنواع العلاجات المختلفة.

نستطيع تقديمه هو رفع العبء المادي عنهم. تجدر الإشارة إلى أن المرض يصيب الفئة العمرية من ٢٠ إلى ٤٠ عاماً، ولذلك فإذا تم دعم العلاج بشكل أكبر والاهتمام بهذه الفئة من المرضى، وهي الفئة الأكثر إنتاجاً في المجتمع، سنساعد في إنقاذ شبابنا من تدهور حالتهم. وأوضح د. مجدهود زكريا أستاذ أمراض المخ والأعصاب بجامعة عين شمس أنه كلما بدأ العلاج مبكراً، زادت فرصة المريض ليظل في المراحل الأولى من المرض