

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Sharq Al Awsat
DATE:	16-May-2015
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	200,000
TITLE :	Vitamin B3 Protects against Skin Cancer
PAGE:	Back Page
ARTICLE TYPE:	General Health News
REPORTER:	Staff Report

فيتامين (ب3) يقي من سرطان الجلد

بسبب الأشعة فوق البنفسجية لأشعة الشمس

لندن «الشرق الأوسط»

في جامعة سيدني إلى أن مادة حبس ريفين،

«نيكوتيناميد» موجودة في

الجلدة وغير موجودة في

الشوكولاته وتفسد قدرة

الشخص التي تدمي الجسم

الجسمية ودور بول يورين

الشوكي المخلية وتفسد قدرة

هي مؤسسة بابلو الدو باته

هجزار لمناعة بالجلد على

(نيكوتيناميد) قلل من

استقبال الخلايا الشاذة.

خطر إصابة الخلايا المغذية

والخلايا المصفية بالأورام

والبيه في استخدامه ممكناً.

وقالت بوبونا مدانا استاذة

الأمصال الجلدية بجامعة

وكلية التوعان الشasan من

سرطان الجلد هو الفرض

الدراسات طولية لأشعة فوق

نيكوتيناميد) يukan المحسول

بروسن وهي مفيدة للبشرة

بروسن طولية لأشعة فوق

البنفسجية الصادرة عن أشعة

هذين العاملين». وقالت:

أهذا بعد بدء العلاج بثلاثة

أشهر لكن هذا الأمر يتوقف

على آثار جانبية منها الصداع

بعد امتناع المريض عن تناولها

وانتفاخ سقط الدم، وطلب

المباحثونجمهور لا سيما

لولند الأخضر عرضه للإصابة

بالسرطان - بغيره استخدم

الدفاتن الواقعية من الش肃 مع

الشخص المختتم للتتأكد من عدم

عليها سمهولة ويسعى زهيد

الإصابة سرطان الجلد.

وقال بيتر بول يورين

البيه وغير موجودة في

الجلدة من حيث سرطان الجلد

الاجتماعي السنوي لها في نهاية

النهر الجارى بان هذه النتائج

قد تفتح الوصول لاسلوبي للحد

من احياء سرطان الجلد الذي

يكتسب اصلاً بين ذوي المبشرة

الجلدة شيوعاً

الدراسات تعاطي جرعتان من

نيكوتيناميد» بربن يومياً،

الافتاد.

النبر إلى ان تناول جرعة

نيكوتيناميد تقلل بنسبة 25 في

العلاج الورام ليس الاعقاد

في مؤسسة بابلو الدو باته

الاصحاء السنوي لها في نهاية

النهر الجارى بان هذه النتائج

قد تفتح الوصول لاسلوبي للحد

من احياء سرطان الجلد الذي

يكتسب اصلاً بين ذوي المبشرة

الجلدة شيوعاً

الدراسات تعاطي جرعتان من

نيكوتيناميد» بربن يومياً،

الافتاد.

النبر إلى ان تناول جرعة

نيكوتيناميد تقلل بنسبة 25 في

العلاج الورام ليس الاعقاد

في مؤسسة بابلو الدو باته

الاصحاء السنوي لها في نهاية

النهر الجارى بان هذه النتائج

قد تفتح الوصول لاسلوبي للحد

من احياء سرطان الجلد الذي

يكتسب اصلاً بين ذوي المبشرة

الجلدة شيوعاً

الدراسات تعاطي جرعتان من

نيكوتيناميد» بربن يومياً،

الافتاد.