

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Shorouq
DATE:	9-April-2015
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	280,000
TITLE :	El Adawy: Avian Flu Infection Rates this year Are Unprecedented
PAGE:	02
ARTICLE TYPE:	MoH News
REPORTER:	Assma Srou

عدوى: معدلات الإصابة بإنفلونزا الطيور العام الحالي غير مسبوقة

كتبت- أسماء سرور:

قال د. عادل عدوى وزير الصحة والسكان، إن هذا العام شهد زيادة غير مسبوقة في عدد الإصابات بإنفلونزا الطيور، مرجعا سبب ذلك إلى تطور أساليب التشخيص واكتشاف الإصابة بالمرض.

وأكد عدوى في تصريحات له الشروق، أمس، أن الوزارة استقبلت بعثة دولية مشتركة في الفترة من ٨ - ١٢ مارس الماضي، لتقييم إجراءات مكافحة إنفلونزا الطيور بمصر وتقديم المشورة بشأن التدابير الصحية الأكثر مناسبة وفعالية في التعامل مع فيروس إنفلونزا الطيور. موضحا أن تقرير البعثة انتهى إلى أن انتشار الفيروس في مصر يرجع إلى قلة الوعي والعادات الثقافية المرتبطة بتربية الطيور في المنازل، وضعف نظم المتابعة والرقابة على دواجن التربية المنزلية، والحاجة إلى زيادة تفعيل التواصل مع أصحاب المزارع لتنمية الوعي لديهم بأهمية وخطورة الموقف، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين وزارتي الصحة والزراعة والمحافظات والقطاع الخاص.

من جانبه، قال عضو اللجنة القومية لمكافحة الإنفلونزا بوزارة الصحة د. ناصر عبده، إن مصر سجلت ٢٨ وفاة و١٣٤ حالة إصابة بإنفلونزا الطيور في ٢٠١٥، وفقا للحالات الموثقة لدى اللجنة. مضيفا أن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي سجلت هذه الزيادة الملحوظة في الحالات، وهو أمر يستدعي الانتباه العالمي له، وأكد أنه وفقا لمنظمة الصحة العالمية فإن هناك حالة إصابة بإنفلونزا الطيور كل يومين في مصر، وأرجع سبب التزايد الواضح في الإصابات إلى التزايد في عدد بؤر الدواجن، مع تزايد التربية المنزلية، التي يعتمد عليها الكثيرون كمصدر دخل رئيسي من دون رقابة أو تطعيمات كافية. وأشار عبده إلى أن أقل عدد لإصابات المرض في مصر سجل في العام الماضي، بإجمالي ٤ إصابات، بينما يأتي عام ٢٠١١ بأعلى عدد للإصابات حيث وصل إلى ٣٩ حالة، لكن معدلات الوفاة بينهم كانت ٤ حالات فقط. متوقعا انخفاض عدد الإصابات بالمرض بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة بسبب ارتفاع درجة الحرارة، وأن تقل عدد الإصابات والوفيات بينها خلال الشهر الحالي، لافتا إلى أن معدلات الوفاة بين المصابين خلال هذا العام انخفضت إلى ما يقرب من ٣٠٪ من الإصابات.