

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Wafd
DATE:	21-December-2015
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	600,000
TITLE :	Medical conference discusses: Ways to treat blood glucose level drop
PAGE:	08
ARTICLE TYPE:	NGO News
REPORTER:	Kazem Fadel

مؤتمر طبي يناقش: طرق علاج هبوط السكر في الدم

استضافت مدينة الأقصر ولدة ثلاثة أيام المؤتمر الدولي الأول للغدد الصماء والسكر، الذي نظمته الجمعية المصرية للغدد الصماء والسكر وتصلب الشرايين، بالتعاون مع الجمعية الأمريكية للغدد الصماء.

ناقش المؤتمر كل ما يتعلق بمرض السكر بما في ذلك الأسباب وطرق التشخيص والمضاعفات وطرق الرعاية الطبية المقدمة للمرضى وأفضل البدائل العلاجية المتاحة على المستوى العالمي والمحلي.

شارك فيه أكثر من ١٠٠٠ طبيب ومتخصص في مجال الغدد الصماء والسكر من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى ١٨ متحدثاً عالمياً من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وآسيا، و١٠ متحدثين من مصر.

ومن بين الموضوعات التي ناقشها المؤتمر الدولي في دورته الأولى: انخفاض مستوى السكر في الدم، طرق إدارة السمنة المفرطة، الأسس القاعدية في علاج السكر، طرق إدارة السكر من النوع الثاني، أمراض الأعصاب والسكر، القدم السكري، علاقة السكر بأمراض الكبد والكلى وغيرها من الموضوعات الأخرى.

تطرق المؤتمر بشكل أساسي لمناقشة أحدث الدراسات الخاصة بأسباب ومخاطر وطرق تقادي انخفاض مستوى السكر في الدم لدى المصابين بالسكر، حيث أوضحت الدراسات أن انخفاض مستوى السكر في الدم يحدث عندما يتناول مرضى السكر جرعات خاطئة من علاجهم، أو عند أخذ جرعة الأنسولين في التوقيت الخاطئ، أو عدم تناول الطعام في الأوقات المناسبة، أو أخذ الجرعة في مكان خاطئ أو بطريقة خاطئة.

ومن الضروري استشارة الأطباء فيما يتعلق بأفضل الطرق للتعامل مع انخفاض مستوى السكر في الدم، خاصة أن ١٥٪ فقط من مرضى السكر من النوع الثاني يستطيعون طبيهم عند إصابتهم بنقص مستوى السكر في الدم، ويقوم ٤٢٪ من مرضى السكر من النوع الثاني بتعديل جرعة الأنسولين الخاصة بهم عند شعورهم بنوبة غير شديدة من نقص مستوى السكر في الدم، بينما يقوم ٧٤٪ من مرضى السكر من النوع الأول بتعديل جرعة الأنسولين الخاصة بهم بعد شعورهم بنوبة شديدة من انخفاض السكر في الدم.

يقول الدكتور فهمي أمارة، أستاذ الغدد الصماء والسكر بطب الإسكندرية، رئيس الجمعية المصرية للغدد الصماء والسكر وتصلب الشرايين، رئيس المؤتمر: «يعاني من مرض السكر حوالي ٢٨٢ مليون شخص في العالم، ومن المتوقع أن يصل عدد المصابين به إلى ٥٩٢ مليون شخص بحلول عام ٢٠٢٥، وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحدها يصل عدد المصابين بالسكر إلى ٣٦ مليون شخص، وتؤكد أحدث الأبحاث والدراسات المتخصصة أن معدلات الإصابة بمرض السكر مرتفعة بصورة كبيرة في البلاد النامية بسبب اتباع أساليب الحياة غير الصحية والنظم الغذائية الخاطئة، التي تتصف بزيادة السرعات الحرارية في الأكل وقلة الحركة وعدم مزاولة الرياضة بشكل منتظم الذي يؤدي بدوره إلى مرض السمنة، وهو من أسباب مرض السكر، بالإضافة للعوامل الوراثية، وتجاهل عدد كبير من المرضى نصائح الطبيب، وهو ما يعرضهم لمشاكل ومضاعفات صحية خطيرة، ويعتبر انخفاض مستويات السكر في الدم من الأمور المقلقة لدى الطبيب والمريض معا بسبب تأثيرها الضار على المريض من الناحية الصحية».

وتحدث الدكتور محمد البحراوي، أستاذ الأمراض الباطنة والسكر بطب الإسكندرية، نائب رئيس المؤتمر، عن انخفاض مستوى السكر في الدم قائلا: «إن غيبوبة انخفاض السكر تنتج عن نقص مستوى الجلوكوز في الدم، وتتمثل أهم أسبابها في تناول جرعة كبيرة من علاج السكر، أو عدم تناول الوجبات في موعدها، ومن أعراض انخفاض السكر في الدم فقدان الوعي، والعرق بغزارة، وشحوب في لون الوجه، وزيادة في ضربات القلب، والصداع، وزغلة في العين، ورعشة في الأطراف والإحساس بالهبوط العام، والإرهاق الشديد وفقدان في التركيز أو فقدان الوعي، وغالبا ما يكون مستوى السكر في الدم أقل من ٧٠- ملليجرام/ديسيليتر.

ومن الأفضل في هذه الحالة أن نعطى المريض نصف كوب مشروب سكري مثل العصير، وفي حالة الغيبوبة نلجأ فوراً إلى المستشفى، لأن أي تأخير يكون فيه خطورة شديدة على المريض، كما يؤدي انخفاض السكر، مما قد يؤدي إلى زيادة مخاطر إصابته بانوبات الشديدة من هذه الحالة».

وأضاف الدكتور محمد البحراوي، أن هناك علاجاً جديداً من الجيل الثاني من عقاقير الأنسولين وهو عقار ديجلويديكالتي أتاحت تقنية تصنيعه إمكانية تناوله مرة واحدة في أي وقت في اليوم، ليستمر تأثيره في ضبط مستوى السكر بالدم أكثر من ٤٢ ساعة، مما يقلل نوبات انخفاض السكر في الدم.

حيث أثبتت دراسة بحثية استمرت سنتين على أكثر من ألف مريض أنه أمكن باستخدام الأنسولين الجديد خفض معدل نوبات هبوط السكر الشديدة بنسبة ٦٩٪ وخفض معدل نوبات الهبوط في فترة الليل بحوالي ٤٢٪ وهي الفترة الحرجة حيث لا يستطيع المريض الإحساس بحدوث نوبة الهبوط.

وأضافت الدكتورة ميهاج سوكة، أستاذ السكر وسكرتير عام المؤتمر: من أهم البدائل العلاجية الجديدة لمرض السكر، عقار إيراغلوويد، ويمثل «إيراغلوويد» عقاراً جديداً لعلاج السكر من النوع الثاني دون التأثير على وظائف الكلى، وهو يعادل في تركيبه ٩٧٪ من الهرمون الطبيعي داخل الجسم، مما يقلل الأجسام المضادة وبالتالي الاحتفاظ بفعاليتها داخل الجسم، يتم تناول العقار طبيعياً، وتحسين الأداء الوظيفي لخلايا بيتا، مما يسمح بزيادة إفراز الأنسولين، كما يساعد العلاج الجديد على خفض الوزن.

الجدير بالذكر أن مصر تاني من أعلى المعدلات لانتشار مرض السكر في العالم، حيث تبلغ نسبة المصابين بالمرض أكثر من ١٥,٦٪ من إجمالي عدد البالغين في البلاد، وهو ما يمثل ٧,٥ مليون مريض تقريباً، وبالتالي تشغل مصر المرتبة التاسعة عالمياً من حيث عدد المصابين بالمرض ونسب انتشاره، وللمرض شق وراثي وآخر يتعلق بأسلوب الحياة ونمط الغذاء ومستوى الرعاية الصحية، ومن المتوقع أن يصل عدد المصابين به إلى ١٢ مليون شخص بحلول عام ٢٠٢٠.

تابع المؤتمر: كاظم فاضل