

PRESS CLIPPING SHEET


PUBLICATION:	Al Wafd
DATE:	23-November-2015
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	600,000
TITLE :	The importance of early brain stroke treatment
PAGE:	14
ARTICLE TYPE:	General Health News
REPORTER:	Mostafa Donkol

أهمية العلاج المبكر للسكتة الدماغية

كتب - مصطفى دنقل:

السكتة الدماغية من أكثر الأمراض تأثيراً على حياة الإنسان ومدى جودة حياته حيث تترك أثراً صحياً كبيراً على الفرد والسكتة الدماغية تكون ناتجة عن انقطاع الدم عن الوصول إلى جزء من المخ، إما نتيجة انسداد شريان أو انقطاع الشريان المغذي للمنطقة بالمخ. يقول الدكتور مجدي يوسف، أستاذ المخ والأعصاب والعمود الفقري: السكتة الدماغية الناتجة عن انسداد شريان تحدث إما بسبب جلطة داخل الشريان نفسه أو جلطة بمكان آخر بالجسم انفصلت واستقرت بشريان المخ أدت إلى انقطاع الدم عن الجزء المغذي من المخ بواسطة هذا الشريان أو تكون ناتجة عن حدوث انفجار بالمخ لشريان أو وريد يؤدي إلى انقطاع الدم عن جزء من المخ ومن الضروري معرفة الأعراض الناتجة عن السكتة الدماغية حتى يتسنى للمريض أو أحد مرافقيه سرعة التوجه إلى المنشأة الصحية حتى يتم إعطاؤه العلاج اللازم بالسرعة المطلوبة، وكلما أسرع لتلقي العلاج في الوقت المناسب قلت الأضرار الناتجة عن السكتة الدماغية. ويضيف الدكتور مجدي يوسف: من الأعراض التي قد تنتج عن السكتة الدماغية حدوث ضعف بجانب من الجسم كالطرف العلوي والسفلي للجانب الأيمن مثلاً وحدثت صعوبة بالكلام أو فهم حديث المحيطين وحدثت ضعف بعضلات الوجه وحدثت عدم اتزان بالحركة وحدثت تدهور بدرجة الوعي وإذا حدث أحد هذه الأعراض لدى المتواجدين بالمنزل ينصح بسرعة التوجه إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم بعد عمل جميع الفحوصات اللازمة، وتشمل عمل أشعة مقطعية على المخ بالكومبيوتر وعمل موجات صوتية على القلب وعمل أشعة على شرايين الرقبة أو عمل قسطرة تشخيصية على شرايين المخ.


ويرى الدكتور مجدي يوسف أن علاج السكتة الدماغية يعتمد في الأساس على سبب السكتة الدماغية، فإذا كان السبب انسداداً بشريان المخ، فإن الهدف هو إزالة هذا الانسداد، أما إذا كان السبب هو حدوث نزيف بالمخ، فالهدف هو السيطرة على النزيف، وعلاج السكتة الدماغية الناتجة عن انسداد شريان بالمخ يكون بإعطاء



السكتة
الدماغية لها
علامات مبكرة

الناتجة عن السكتة الدماغية، ويحتاج المريض إلى علاج طبيعى وعلاج تأهيلي للكلام وعلاج تأهيلي للعمل، وإن فترة التعافي من السكتة الدماغية يعتمد على مدى قوة المرض ومدى تأثيره على جزء المخ المتضرر وعلى مدى قوة العلاج التأهيلي عقب الإصابة بالسكتة الدماغية، ومن الضروري تحديد العوامل الخطرة المؤدية للسكتة الدماغية ومحاولة السيطرة عليها حتى لا يتكرر حدوث المرض مستقبلاً ودائماً ما تكون الوقاية خيراً من العلاج.

العلاجات المذنبية للجلطة وإعطاء علاجات تحسن تدفق الدم إلى المخ ومن الممكن اللجوء إلى القسطرة العلاجية لإزالة الانسداد الموجود بشريان المخ ويعطى علاج الأسبرين كوقاية من حدوث جلطات أخرى، وعلاج النزيف يكون بواسطة خفض ضغط الدم ومن الممكن اللجوء للجراحة لإيقاف النزيف وتقريبه لتخفيف ضغط الدم وغلق الشريان المنفجر وبعد تلقي علاج السكتة الدماغية فإنه من الضروري تلقي علاج تأهيلي بسبب الأضرار



د. مجدي يوسف