

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Sharq Al Awsat
DATE:	21-November-2015
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	200,000
TITLE :	Birth control pills and ovarian cancer
PAGE:	19
ARTICLE TYPE:	Drug-Related News
REPORTER:	Dr. Abdel Hafez Khoga

يتناولون هذه الحبوب على الإطلاق. وأوضح تفاصيل تلك الدراسة أنها أجريت في كلية الطب بجامعة ديووك في درهام بولاية نورث كارولينا الأمريكية Duke University in Durham. وقام بإجرائها فريق عمل من الأساتذة المتخصصين بالجامعة برئاسة الدكتورة لورا هاوريلسكي Laura Haurelski، ولفت إلى أن هذه الدراسة أكدت للباحثين والمتخصصين في مجال طب النساء والولادة بكافة دول العالم وجود علاقة إيجابية بين استخدام حبوب منع الحمل والوقاية من سرطان المبيض، كما أنها أضافت ثقلًا علميًّا لهذه العلاقة.

وأضاف كاشقري أن الباحثين أكدوا في دراستهم مدى فاعلية استخدام حبوب منع الحمل ومسؤوليته عن تقلص خطر التعرض للإصابة بسرطان المبيض وأن كل 185 من النساء يحتاجن إلى استخدام حبوب منع الحمل لمدة خمس سنوات لمنع إصابة إداهن بالمرض، وأشار إلى أن الدراسة لم تثبت أن استخدام الحبوب يقلل من خطر إصابة المرأة بأمراض أخرى لأنه يمكن أن تكون هناك عوامل أو اختلافات أخرى لم يتم قياسها لدى النساء اللائي يتناولن حبوب منع الحمل، واللاتي لم يتناولنها ولم يلحظها الباحثون أثناء البحث.

ودعا الأمين العام للجمعية السعودية للنساء والولادة جميع النساء اللاتي يستخدمن حبوب منع الحمل إلى ضرورة اتباع نصائح وتحذيرات الأطباء المعالجين لهن حول كيفية وإالية استخدام حبوب منع الحمل، وذلك من أجل المحافظة على صحة وسلامة المرأة التي تمر بأهمية بالغة في المجتمع ولكنها هي الأم والزوجة ولأنها تعتبر هي أساس كل مجتمع.

بين الخطأ والصواب

د. عبد الحفيظ خوجة

استشاري في طب المجتمع

مدير مركز المساعدة التخصصي مستشفى الملك فهد بجدة
a.khojah@asharqalawsat.com

حبوب منع الحمل وسرطان المبيض

• كانت النساء وما زال

بعضهن يخشين استخدام حبوب منع الحمل خوفاً من الإصابة بالمضاعفات التي تثار حولها، وفي الحقيقة ما هي إلا اعتقادات خاطئة، والكثيرات من يستخدمن حبوب منع الحمل كوسيلة لتنظيم الإنجاب لا يعلمون أن هناك من الدراسات الحديثة ما ثبتت وجود ارتباط وثيق بين استخدام حبوب منع الحمل وانخفاض خطر الإصابة بسرطان المبيض.

الأمين العام للجمعية

ال سعودية للنساء والولادة الدكتور فيصل كاشقري يؤكد ذلك، مشيراً إلى دراسة أمريكية جديدة أجريت في هذا الإطار، خلصت إلى أن النساء اللاتي تناولن حبوب منع الحمل لمدة 10 سنوات أو أكثر هن أقل عرضة لسرطان المبيض بنسبة 50 في المائة عن أولئك اللاتي لم

