



## PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Khaleej
DATE:	13-December-2015
COUNTRY:	UAE
CIRCULATION:	115,000
TITLE:	New Dual-Impact Drug to Help Save Vision of Patients with Diabetic Macular Edema (DME)
PAGE:	4
ARTICLE TYPE:	Agency-Generated News
REPORTER:	Iman Abdallah
AVE (AED):	6,000

## عقار حديث ذوفاعلية ثنائية لعلاج اعتلال الشبكية السكري

## دبي ـ «الخليج»:

عقدت جمعية طب العيبون الإماراتية مؤتمرها السنوي السادس عشر، برعايبة مجموعة من كبرى شركات الرعاية الصحية ومن ضمنها شركة باير هيلث كبر، في مركز دبي التجاري العالمي من 10 إلى 12 ديسمبر شبكة تواصل لمجتمع طب العيون في منطقة الخليج حيث القى الضوء على أحدث المؤتمر تبادل التعون، كما استهدف المؤتمر تبادل أمراض العيون، كما استهدف المؤتمر تبادل الشبرات في علاج أمراض الشبكية وطرق التعامل معها، وعلى رأسها اعتلال الشبكية وطرق السكري الذي يعانيه نحو 21 مليون مريض على مستوى العالم، طبقنا لتصريحات على على حالية أعراض الشبكية وطرق المؤتمر تبادل الشبكية وطرق على رأسها اعتلال الشبكية على مستوى العالم، طبقنا لتصريحات على مستوى العالم، طبقنا لتصريحات

الدكتـورة فاطمـة إبراهيــم الأميري، رئيسـة اللجنــة الوطئيــة لصـحة العــين ومكافحــة العمى بوزارة الصـحة، ورئيسـة قسم العيون بمستشفى القاسمي والعين في الشارقة.

بمستمعى العاسمي والعين في المداره...
وأضافت الأميري: «ناقش المؤتمر أحدث
علاجات اعتـلا الشبكية السكري وعلـي
رأسها العقار الحديث ثناني الفاعلية الذي
يمثل خطوة مهمة في علاج اعتلال الشبكية
السكري الذي يُعدَ السبب الرئيسي في حالات
شقدان البصر الجديدة بين الأشخاص الذين
تراوح أعمارهم من 20 و74 عاماً، ويتيـح
العقار خيارا إضافيا لمرضى السكري الذين
يعانـون فقدان أو ضعف البصر ويُمكنهم
من اتخاذ خطـوة اسـتباقية للسـيطرة علي
المرض وتحسين نظرهم بشكل مستدام علما
المان الحقن يكـون متكـرزاً في هـذه الحالات

لتحقيــق النتائج المطلوبة، بحسـب ما أكدته نتائــچ بيانات المرحلة الثالثة من الدراســتين VIVID-DME و VISTA- DME،

وقالت (إن العجـز البصـري النـاتج عـن الإصـابة باعتلال الشـبكية السـكري يصـيب وهو السبب الأكثر انتشـازًا للعمى في مراحل وهو السبب الأكثر انتشـازًا للعمى في مراحل العمر الإنتاجية،. وأضافت «كان الاتحاد الدولي فيها خمس من عشر دول سجلت أعلى معدلات فيها خمس من عشر دول سجلت أعلى معدلات انتشـار مرض السـكري (بـين البالغين الذين تـراوح أعمارهم مـن 20 إلى 79 عاما)، وتجدر الإشـارة إلى أن معدلات الإسـابة بداء السكري في هذه الدول كالتالي؛ السعودية (23.9٪)، البحريـن (21.9٪)، قطر ( 18.8٪)،

وأوضحت الأميري أن عدم استقرار مستوى السكر في الدم يؤثر سلبًا في الأوعية الدمويـــة الصــغيرة داخل شــبكية العين، ما يجعلها تُسرُب الســوائل والدهون إلى منطقة مركز الشــبكية التي يطلق عليها مقلة العين، الأمر الذي يسبب اعتلال الشبكية السكري.

وعلقت على نتائج المرحلة الثالثة من 
VISTA- DME و VIVID-DME و 
VISTA- DME و 
VIVID-DME و 
VISTA- DME و 
VIVID-DME و 
VISTA- DAE و 
VISTA- DAE (
VISTA- VISTA) 

VISTA- VISTA 

VISTA