

## PRESS CLIPPING SHEET

<b>PUBLICATION:</b>	Al Watan
<b>DATE:</b>	6-August-2015
<b>COUNTRY:</b>	Egypt
<b>CIRCULATION:</b>	220,000
<b>TITLE :</b>	Beware of Chickenpox Virus
<b>PAGE:</b>	14
<b>ARTICLE TYPE:</b>	General Health News
<b>REPORTER:</b>	Staff Report

### احترس من فيروس «الجدري المائي»

الجدري المائي من الأمراض شديدة المدوى، ويكون الطفل المصاب به مصدراً للعدوى، وخاصة ذلك خلال أسبوع. تراوح فترة الإصابة به والأعراض من ٢ إلى ٣ أسابيع، تكون بداية ظهوره في منطقة البطن أو الظهر والوجه ثم ينتشر إلى باقي أجزاء الجسم بما في ذلك فروة الرأس، الفم، الأنف، الأذن، والأعضاء التناسلية. يأتي في صورة حبيبات حمراء صغيرة متعددة تشبه لدغة الحشرات، ثم تتحول إلى بثور (حويصلات) صغيرة لها جدار وقيق وتحتوي على سائل شفاف، وبعد ذلك ينفجر (يفتح) جدار الحويصلات وتظهر مكانها قرح صغيرة تكون بعد ذلك قشوراً جافة داكنة اللون، ويطهر المفعح الجلدي في خلال ٢ - ٤ أيام، مصححون بعكة جلدية شديدة، مما قد يتسبب في حدوث التهاب يكتيرى للبثور، فتعمى بسائل أصفر اللون يعرف بالصدى، عادة ترتفع درجة حرارة الطفل قبل ظهور المفعح الجلدي بيوم أو اثنين، وتتراوح حرارته في تلك الفترة بين ٣٧،٧ - ٣٨،٨ درجة ومن الممكن أن تزيد على ذلك.

قد تظهر على الطفل أعراض أخرى مثل ألم بالبطن، والحلق، صداع، أو الشعور بالتعب والإرهاق العام.

وبالرغم من أن الجدري المائي مرض ليس خطيراً فإنه يمكن أن يتسبب في مضاعفات خطيرة، خاصة في الأطفال، قد يصل إلى الرئة، أو المفاصل، أو المخ، ولكنها حالات نادرة.