

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Tahrir
DATE:	19-August-2015
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	120,000
TITLE :	Antipyretics Double the Risk of Heat Strokes
PAGE:	Back Page
ARTICLE TYPE:	Drug-Related News
REPORTER:	Lana Ahmed

«أدوية الحرارة» تضاعف من خطورة ضربات الشمس

ارتفاع الحرارة، عن طريق إزالة ملابس المريض، وتبليل جسده بالماء وأكياس الثلج. كما نبه على خطورة إعطاء الأدوية الخافضة للحرارة، كالأسبرين والبنادول والبروفين والفولتارين، للمريض في حالة إصابته بضربة شمس، لأنها قد تؤدي الحالة، مضيفا أنه ينصح في هذه الحالة بإعطاء المريض عقار مهدئ كـ«البنزودايزين»، الذي يسبب هدوء المريض، وبالتالي يقلل من ارتفاع حرارة الجسم أكثر.

كتبت- لانا أحمد:

مجموعة من النصائح الطبية قدمها الدكتور محمد طنطاوى، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى، لتجنب حالات «الصدمة الحرارية» «ضربة الشمس» التى تتسبب فى حدوث ارتفاع درجة حرارة الجسم لتصل إلى ٤١ درجة مئوية. وأول النصائح التى يقدمها د.طنطاوى تتجسد فى ضرورة التبريد المستمر للجسم، الذى يعتبر الحل الأسرع والأهم لعلاج