

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Hayat
DATE:	11-September-2015
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	267,370
TITLE :	Does Stomach Cancer Affect Men More than Women?
PAGE:	16
ARTICLE TYPE:	General Health News
REPORTER:	Staff Report

سرطان المعدة يصيب الرجال أكثر من النساء؟

■ يُعتبر سرطان المعدة من السرطانات الشائعة في العالم، وهو يصيب الرجال أكثر من النساء بمرتين، خصوصاً في الشريحة العمرية من ٤٠ إلى ٧٠ سنة. وهو مرض صامت يبدأ خلسةً ويتطور خفيةً، وفي معظم الأحوال لا يتم الكشف عنه إلا بعد فوات الأوان، ويرجع السبب إلى عدم وجود عوارض وعلامات وصفية مبكرة تشير إلى وجوده، حتى لو وجدت فهي تكون غير مثيرة للاعتناء، وغالباً ما تركز بالمعالجات العرضية التي يأخذها المريض بوصفة أو من دون وصفة.

لا توجد أسباب واضحة لسرطان المعدة، لكن ثمة عوامل خطر تزيد من احتمال الإصابة به. ويمكن النظام الغذائي أن يساهم في تطوره، فهو مثلاً يميل إلى الحدوث في بلدان أكثر من غيرها، مثل اليابان وكوستاريكا وبنغلاديش والبريتغال ورومانيا التي يكثر أهلها من تناول الأطعمة المالحة والمدخنة. ويتنشر سرطان المعدة أكثر بين المدخنين الشرهين. ويمكن الإصابة بالجرثومة

الطيرية أن تساهم في اندلاعه. ويزداد حدوث سرطان المعدة في القسم المتقي منها بعد عمليات البتر التي تجري عليها لسبب أو لآخر. وهناك أدلة على توارث عائلي لسرطان المعدة، فتأليلون بونابرت وأبوه وجده وثلاث من أخواته أصيبوا به.

المظاهر السريرية لسرطان المعدة تكون عادةً غير نوعية، وتلتبس في كثير من الأحيان مع مظاهر القرحة الهضمية. ويكون الألم المتموضع في منتصف البطن وأعلى هو أكثر العوارض مشاهدة في المراحل المبكرة من سرطان المعدة، ويتميز عادة بأنه وجع مستمر وغير منتشر، ولا يتحسن بتناول الطعام، ويهدأ بعد أخذ مضادات الحموضة، الأمر الذي يثير الشكوك في وجود القرحة، ما يؤخر عملية التشخيص.

وقد ينطلق سرطان المعدة بعوارض أخرى غير نوعية، مثل الغثيان، عسر الهضم، الحموضة، الإسهال، الإمساك، وضيق الوزن غير المبرر.