



PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Dostour
DATE:	30-September-2015
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	230,000
TITLE:	Good news for diabetes patients: A new drug to treat the
	disease without low sugar attacks or weight gain
PAGE:	05
ARTICLE TYPE:	NGO News
REPORTER:	Tamer Farouk

بشرى سارة لمرضى السكر: **جديد لعلاج المرض دون نوبات انخفاض أو زيادة في الوزن**

كتب - تامر فاروق:

كشف المؤتمر الدولي للسكر عن انتصار علمى جديد أمكن تحقيقه بظهور دواء جديد لعلاج مرض السكر من النوع الثاني يماثل في تركيبته ٩٧٪ من الهرمون الطبيعي داخل الجسم، مما يقلل الأجسام المضادة وبالتالي الاحتفاظ بفعاليته داخل الجسم

فيما أتاحت تقنية تصنيعه تناوله مرة واحدة في اليوم، ليستمر تأثيره في ضبط مستوى السكر بالدم دون انخفاض على مدار الـ ٢٤ ساعة، مما يجنب المريض نوبات الدوخة والإغماء، وأضيف لقدرات العقار الجديد اليراجلوتيد ميزة إبطاء حركة المعدة مما يترتب عليه خفض الوزن مما يمثل طفرة كبيرة بالنسبة لمرضى السكر من النوع الثانى لمعاناة أغلبهم من السمنة.

ووصف السدواء بأنه شورة علمية وليس مجرد اسم جديد في طابور الأدوية لأنه يقوم بالاهتمام بالمضاعفات أو الأثار الجانبية التي تواجه أغلب مرضى السكر الذين يبلغ عددهم حوالي ٣٨٢ مليون شخص في العالم، من بينهم ه,۷ مليون شخص مصاب في مصر.

وأوضحت الأستاذة الدكتورة، إيناس شلتوت، رئيس الجمعية العربية لدراسة أمراض السكر والميتابوليزم، وعضو الاتحاد العالمي لمرض السكر، أن علاج السكر الجديد اليراجلوتيد، يُعد واحدًا من الأدوية التي يمكن للمريض استخدامها مرة واحدة يوميّا دون التقيد بمواعيد الطعام مما يتيح الفرصة للمرضى ممارسة الأنشطة اليومية بصورة طبيعية، ويتميز بخفض خطورة التعرض للانخفاض



د. ایناس شلتوت

الشديد في سكر الدم، وتحسين الأداء الوظيفي لخلايا بيتا، مما يسمح بزيادة إفراز الأنسولين. وأشار إلى أن أهم ميزة للعلاج الجديد هي قدرته على خفض الوزن الزائد، بنسبة تتراوح ما بين ٥ و٧ كيلوجرامات خلال فترة تتراوح ما بين ؛ و٦ أشهر ليصبح وسيلة فعالة في خفض الوزن دفعت هيئة الغداء للموافقة المبدئية بموافقة ١٤ عضوًا في مقابل واحد على تسجيله بتركيز أعلى كعقار لخفض الوزن، وذلك من خلال زيادة الإحساس بالشبع وتأخير إفراغ المعدة، ويعد ذلك عاملاً هامًا في علاج مرضى السكر من النوع الثاني خاصة في ظل معاناة كثير من مرضى السكر من السمنة،



العقار الجديد أعطى الأمل للملايين

كما يساعد على التخلص من الدهون الزائدة خاصة الدهون المتركزة في منطقة البطن. وتمكن المرضى الذين استخدموا عقار ليراجلوتيد خلال رمضان من الوصول إلى نسبة السكر التراكمي HbAIC المستهدفة مع عدم حدوث نوبات انخفاض السكر أو زيادة في الوزن بنسبة أكثر من ضعف العقار المقارن. ويصوم كل عام حوالي خمسين مليون مسلم من المصابين بمرض السكر حول العالم، وتشير التقديرات إلى أن أغلبهم مصاب بالنوع

الثاني من المرض، وقد يؤدي الصيام إلى زيادة

احتمالية إصابتهم بخلل في مستوى السكرفي

الدم، سواء هبوطًا أو ارتفاعًا.

ومن العوامل التي تؤدي لخطورة تلك الاحتماليات الانقطاع عن الطعام لفترة طويلة ثم الإفطار على وجبة كبيرة، حيد يمكن أن يؤدي ذلك لمضاعفات مثل الاختلال الملحوظ في مستوى السكرفي الدم أو الجفاف مما قد يستدعى الحصول على رعاية طبية في المستشفى. لذلك فإن على مرضى السكر الذين يرغبون في الص اللجوء للعقاقير التي لا تسبب هبوط السك بعد استشارة الطبيب المعالج، خاصة أن المضاعفات سابقة الذكر تجبر واحدا من كل ثلاثة صائمين من مرضى السكر حول العالم على عدم استكمال صيامهم.