


PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Sayidaty
DATE:	14-November-2015
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	30,000
TITLE :	Sayidaty at international diabetes conference in Frankfurt – 3.9 million diabetics in Saudi Arabia and new treatments promising
PAGE:	118-119
ARTICLE TYPE:	NGO News
REPORTER:	Hala Ahmed

PRESS CLIPPING SHEET



صحة | Health

«سيدتي» في مؤتمر دولي بـ «فرانكفورت» عن السكري 3.9 مليون إصابة بالسعودية والعلاجات الجديدة واعدة

ثمة 387 مليون إصابة بالسكري في العالم حسب إحصائيات سنة 2014، ومن المتوقع أن تزداد الإصابات لتبلغ 592 مليون حالة في سنة 2035. قبيل اليوم العالمي لداء السكري الموافق في 14 نوفمبر (تشرين الثاني)، كانت «سانوفي» نشرت في مؤتمر طبي عالمي بمدينة «فرانكفورت» الألمانية دراستها الدولية المتعلقة في إدارة المصابين بالسكري لحالاتهم وطرق تحكمهم في الداء International Diabetes Management and Practice Study، وعرضت بعض النماذج عن حالات المصابين. علماً أن الدراسة استهلّت منذ سنة 2006، وها هي تشهد المرحلة السادسة لها. المرحلة التي قام أستاذ الغدد الصماء بجامعة «ياوندي» بالكاميرون ورئيس وحدة أمراض الغدد الصماء والتمثيل الغذائي في المستشفى المركزي في «ياوندي» البروفسور جان كلود مبانيا، ونائب الرئيس العالمي للبحث والتطوير لمرض السكري في «سانوفي» الدكتور فيليب لارسن بعرض نتائجها، بحضور «سيدتي» «فرانكفورت» هالة أحمد

PRESS CLIPPING SHEET



الدكتور فيليب لارسن.



البروفيسور جان كلود ميانجا.

طرح المؤتمر مجموعة من العلاجات المتقدمة لداء السكري، والحاصلة على تصريح «الجمعية الأميركية للغذاء والدواء»، وهي:


الـ«إنسولين غلارجين يو 300»: إن هذا النوع من الـ«إنسولين» طويل المفعول، إذ تستمر فعاليته على مدار 24 ساعة متواصلة، ولا يسبب خفوض سكر الدم. في هذا الإطار، كانت دراسات سريرية أثبتت فعالية «يو 300» في الحظ من مستوى السكر التراكمي بشكل فعال، مقارنة بالعلاجات الأخرى.

بودة الـ«إنسولين» للاستنشاق: إن هذا النوع من الـ«إنسولين» يقيد المصابين بالنوعين الأول والثاني من السكري غير المزمن، ويقضي باستعمال جهاز صغير محمول لاستنشاق الـ«إنسولين» مشابه للجهاز الذي يستخدمه المصابون بالربو. في هذا الإطار، كانت دراسة منشورة في مجلة «لانست» الطبية لاحظت أن المصابين بالنوع الأول من السكري، الذين استنشقوا الـ«إنسولين» وفق الطريقة المذكورة، استطاعوا الحفاظ على ثبات معدلات «الغلوكوز» في دماهم بصورة شبيهة تماماً لطريقة العلاج بحقن الـ«إنسولين».

تعتمد هذه التقنية الجديدة على تحويل هرمون الـ«إنسولين» إلى مسحوق (بورة) يوضع في جهاز الاستنشاق (البخاخ)، كي تقوم الرئتان بامتصاصه. علماً أن الجهاز كان طرح للاستعمال في السوق الأميركية منذ بداية العام الحالي.

«ليكسيزيتايد»: إن «ليكسيزيتايد» علاج جديد لداء السكري عبارة عن حقنة وحيدة تؤخذ يومياً، وتعمل على ضبط الشهية، وتمكن المريض من ممارسة يومياته بصورة طبيعية. وفق نتائج التجارب الإكلينيكية التي كانت أجريت على المصل في الحقنة المذكورة، لوحظ أن المصل المذكور بشكل العقار الأول الذي يؤخذ مرة واحدة يومياً، وذلك ضمن فئة العقاقير الدوائية المحفزة لمستقبلات «جي ال بي-1» GLP-1، فقد ثبتت فعاليته، سواء اقترن بالـ«إنسولين» الأساسي أو بالعقاقير القموية الخافضة للـ«غلوكوز» بالدم، في تقليل مستويات السكر بالدم بعد تناول الطعام مباشرة على نحو ملحوظ، بخلاف علاجات الـ«إنسولين» الأخرى.

طرح «المؤتمر» مجموعة من العلاجات المتقدمة لداء السكري



جهاز محمول لاستنشاق الـ«إنسولين».

نتائج بحوث «الاتحاد الدولي لداء السكري» لعام 2014

كان «المؤتمر» شدد، عند عرض انتشار المرض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على النقاط الآتية:

- تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على إصابة حوالي 37 مليون فرد بالسكري، ومن المتوقع ارتفاع هذا الرقم إلى 68 مليون حالة مصابة بحلول 2035. كما أن هناك فرداً من أصل 10 بالغين مصاب بالسكري.
- لم يتم تشخيص حالات 50% من المصابين حتى الساعة!
- من المحتمل أن يتسبب داء السكري بقضاء 363.000 شخص، سنوياً، مع الإشارة إلى أن 53% من هؤلاء هم في سنّ تحت الستين.
- من المتوقع أن يتفق 17 مليار دولار على علاج السكري، أي ما يمثل 3% من إجمالي الإنفاق العالمي على العلاجات كافة. علماً أن قيمة الإنفاق العالمي على داء السكري كانت وازت نحو 612 بليون دولار لسنة 2014.
- يعيش 77% من المصابين بالسكري، في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

في ما يأتي، جدول بالدول الخمس التي تشهد نسب الإصابة الأعلى بالسكري، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفق تقارير «الاتحاد الدولي للسكري»:

الدولة	عدد المصابين بالمليون
مصر	7.593
باكستان	6.944
إيران	4.582
السعودية	3.806
السودان	3.806