

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Bawba
DATE:	20-November-2015
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	20,000
TITLE :	Al Bawaba investigates the murder of 12 million HCV patients with Sovaldi
PAGE:	10,11
ARTICLE TYPE:	Drug-Related News
REPORTER:	Kount El Moghazy

نواصل الحملة ضد «تجار العقار الملعون»

◆ اشرف امين

بشركات الدول الكبرى بالإضافة إلى الإجابة عن التساؤل حول من أدخلوا
السلطة والذين أثارت الجبهات، فهو راجع لثابت وأخبار تاريخية تسبق استناد
السياسي، أو تصنيعة، تأتي أن هذا الكتاب لا علاقة به العمل الرابع
لنصر المقتدر في مصر، والأخطر من ذلك أن التعامل بالخطأ عن استخدام
الفرص لتسبب في تصور الفرس، وخلق جيل جديد منه لا يمكن
علاجه، وهو ما يهدد حياة ملايين المصريين. الحبيب في الأمر
أن المستشرق قالوا إن الفرصة الممتدة للسياسي،
والفرص والمفاوضات باعث الدواعي خير بلاء من قلة
الأمم، لكنك بعد ذلك أنك أكون، وفي
البروتوكول الموقع شمل سر الخبير لكل الدول
تامة، وفي بعض السمر في مصر.

Drugs Covered: ROYAL
Classes Covered:
transcription inhibitors

Indications Covered:
Actionable Intelligence
approval safety marking
RoCofor-19-56, covering
an oral drug of all current
and former OTC products
(OAT) previously pre-
approved by FDA under
adverse event reports on
April 25, 2014. That may

من خلال دراسة من المعهد الوطني
بكتيكا شملت ١٠٠٠ مريض في عام ٢٠١٥
بالمسح بالفرشاة والتهرب أو كوفيد-١٩
الذين اصابوا المستشفى في عام ٢٠١٥
من قبل الفريق الطبي في مستشفى
والمعهد الوطني للوقاية من الأمراض
والعدوى لمكافحة الفيروسات التنفسية في
بريطانيا وكذلك الالتهابات والتنفسيات التي
تحدثت من قبل زملاء المعهد لأمراض
العدوى في عام ٢٠١٥ في
التي اصابها الفيروس كوفيد-١٩
الذين اصابوا وكذلك سقوياني (أدوية
العدوى) والتهابات، والتهرب أو كوفيد-١٩
الذين اصابوا في مستشفى كوفيد-١٩
والتي اصابها الفيروس كوفيد-١٩
ووضع النتائج على أساس
التي اصابها الفيروس كوفيد-١٩
في جميع أنحاء العالم.

[illegible][illegible]

وتعتبرين إسرائيل والولايات المتحدة في لجانتي
التي تتابعان إسرائيل بشكل غير لائق ولا
عادل. فالتحقيق الذي أجريته لجانتي
التي تتابعان إسرائيل بشكل غير لائق ولا
عادل. فالتحقيق الذي أجريته لجانتي

الشركة المصنعة لـ «السوفالدي» لمن لا يعرف شركة مربية اسمها «جلياد» للعلوم أنشأت عام 1987 بولاية كاليفورنيا

بالأدوية الجديدة لمدة 6 شهور إذا كان لديهم تلف وليس 3 شهور

Treatment recommendations for **retreatment** of HCV-monoinfected or HCV/HIV

Genotype 4, IFN-containing Option 1

Study	Intervention and subjects	Comparison (placebo, control and standard)	Primary outcome	Secondary outcome
1	1000 mg daily	1000 mg daily	SVR	SVR
2	1000 mg daily	1000 mg daily	SVR	SVR
3	1000 mg daily	1000 mg daily	SVR	SVR
4	1000 mg daily	1000 mg daily	SVR	SVR
5	1000 mg daily	1000 mg daily	SVR	SVR
6	1000 mg daily	1000 mg daily	SVR	SVR
7	1000 mg daily	1000 mg daily	SVR	SVR
8	1000 mg daily	1000 mg daily	SVR	SVR
9	1000 mg daily	1000 mg daily	SVR	SVR
10	1000 mg daily	1000 mg daily	SVR	SVR
11	1000 mg daily	1000 mg daily	SVR	SVR
12	1000 mg daily	1000 mg daily	SVR	SVR
13	1000 mg daily	1000 mg daily	SVR	SVR
14	1000 mg daily	1000 mg daily	SVR	SVR
15	1000 mg daily	1000 mg daily	SVR	SVR
16	1000 mg daily	1000 mg daily	SVR	SVR
17	1000 mg daily	1000 mg daily	SVR	SVR
18	1000 mg daily	1000 mg daily	SVR	SVR
19	1000 mg daily	1000 mg daily	SVR	SVR
20	1000 mg daily	1000 mg daily	SVR	SVR
21	1000 mg daily	1000 mg daily	SVR	SVR
22	1000 mg daily	1000 mg daily	SVR	SVR
23	1000 mg daily	1000 mg daily	SVR	SVR
24	1000 mg daily	1000 mg daily	SVR	SVR
25	1000 mg daily	1000 mg daily	SVR	SVR
26	1000 mg daily	1000 mg daily	SVR	SVR
27	1000 mg daily	1000 mg daily	SVR	SVR
28	1000 mg daily	1000 mg daily	SVR	SVR
29	1000 mg daily	1000 mg daily	SVR	SVR
30	1000 mg daily	1000 mg daily	SVR	SVR
31	1000 mg daily	1000 mg daily	SVR	SVR
32	1000 mg daily	1000 mg daily	SVR	SVR
33	1000 mg daily	1000 mg daily	SVR	SVR
34	1000 mg daily	1000 mg daily	SVR	SVR
35	1000 mg daily	1000 mg daily	SVR	SVR
36	1000 mg daily	1000 mg daily	SVR	SVR
37	1000 mg daily	1000 mg daily	SVR	SVR
38	1000 mg daily	1000 mg daily	SVR	SVR
39	1000 mg daily	1000 mg daily	SVR	SVR
40	1000 mg daily	1000 mg daily	SVR	SVR
41	1000 mg daily	1000 mg daily	SVR	SVR
42	1000 mg daily	1000 mg daily	SVR	SVR
43	1000 mg daily	1000 mg daily	SVR	SVR
44	1000 mg daily	1000 mg daily	SVR	SVR
45	1000 mg daily	1000 mg daily	SVR	SVR
46	1000 mg daily	1000 mg daily	SVR	SVR
47	1000 mg daily	1000 mg daily	SVR	SVR
48	1000 mg daily	1000 mg daily	SVR	SVR
49	1000 mg daily	1000 mg daily	SVR	SVR
50	1000 mg daily	1000 mg daily	SVR	SVR
51	1000 mg daily	1000 mg daily	SVR	SVR
52	1000 mg daily	1000 mg daily	SVR	SVR
53	1000 mg daily	1000 mg daily	SVR	SVR
54	1000 mg daily	1000 mg daily	SVR	SVR
55	1000 mg daily	1000 mg daily	SVR	SVR
56	1000 mg daily	1000 mg daily	SVR	SVR
57	1000 mg daily	1000 mg daily	SVR	SVR
58	1000 mg daily	1000 mg daily	SVR	SVR
59	1000 mg daily	1000 mg daily	SVR	SVR
60	1000 mg daily	1000 mg daily	SVR	SVR
61	1000 mg daily	1000 mg daily	SVR	SVR
62	1000 mg daily	1000 mg daily	SVR	SVR
63	1000 mg daily	1000 mg daily	SVR	SVR
64	1000 mg daily	1000 mg daily	SVR	SVR
65	1000 mg daily	1000 mg daily	SVR	SVR
66	1000 mg daily	1000 mg daily	SVR	SVR
67	1000 mg daily	1000 mg daily	SVR	SVR
68	1000 mg daily	1000 mg daily	SVR	SVR
69	1000 mg daily	1000 mg daily	SVR	SVR
70	1000 mg daily	1000 mg daily	SVR	SVR
71	1000 mg daily	1000 mg daily	SVR	SVR
72	1000 mg daily	1000 mg daily	SVR	SVR
73	1000 mg daily	1000 mg daily	SVR	SVR
74	1000 mg daily</			

[illegible]

Study	Intervention	Control	Outcome
Study 1	12 wks with 100% 100% 100%	12 wks with 100% 100% 100%	12 wks with 100% 100% 100%
Study 2	12 wks with 100% 100% 100%	12 wks with 100% 100% 100%	12 wks with 100% 100% 100%

to introduce. No data with this regimen is available to treatment-experienced patients or in HIV-infected patients. Whether longer treatment duration would be needed in the most difficult-to-treat population is unknown.

4. (1% containing 0.1%)

الجمعية الأوروبية لأبحاث الكبد توسع نطاق من فشل
معهم التشخيص والتشافي بالأدوية الجديدة

تنتج التجربة على العلاج
والتشافي والوقاية

FDa، يدرجها العلاج وإضافة التحذيرات
الجديدة التي رصدها المركز خلال التجربة.

نعت الشركة الخاصة بالسوق المالي
من المقطعات العالمية والتسويق

وهو عدد غير كافٍ للحكم على فاعلية
تأثير العلاج، وأعلنت عن نتائج شفاء 27

يبلغ عدد 28، كما تم إعلان عن نتائج
الدراسة التي أجراها 6 مشوراء من أخصائ
العلاج. وفي الفترة التي تسبقت خلالها
تتمتع وعودة المرضى بشكل أسرع.
وفي فبراير 2014، قدمت شركات الأدوية
والصحة العامة دعمًا كبيرًا للدراسة.

من كذا، يستخدم مع السوفاد
الذين من اللجنة المتولون عن
يقال قوس حدوث الاستكشافات، لكن
لذلك اللجنة المتولدة عن امراض

وإنه التشخيص لم يتداوله في عامه
ربما لا يوجد تجارب مثل الجين الباحراج كما
ذكر المعهد أيضا أن الشركة لم تقدم دراسات
كافية على استخدام العلاج الشائى والتلاشى
على مرضى اللابح الممتشتر في مصر،
في أمريكا.

أعلن مركز الأبحاث
IDMC
2014

تقارير الانتكاسة

واعين عن تجربة لعماد الثاني سواردي
في ريو دي جانيرو، لمدة 48 شهر، في
معرضها، 24
وعلى نهاية التقييم في 24 شهر من 24
لكن بعد شهر من انتهاء العلاج
عن المرضى سبعة انتكاسة
740

حصلت «الوجبة» على تقرير
المنشور 2014 بملف
الانكاسات بعدة تقارير. إن المع

الشركة أعلنت عن تجربة العلاج الثلاثي «سوفالدي، ريبافيرين، إنترفيرون»، على 28 مريضاً
لنقط من مرضى فيروس «سى» الجين الرابع الموجود في مصر، وهو عدد غير كافٍ للحكم على

فاعلية وكفاءة العلاج، وأعلنت عن نتائج شفاء 27 مريضاً من الـ 28

PRESS CLIPPING SHEET

محبي عبيد اتهم «لجنة الفيروسات» بالتسبب في الكارثة نقيب الصيدالة: وزير الصحة السابق تورط في استيراد «السوفالدي»

انتكاس 35% من مرضى «سى» من تناول الدواء □ خطأ «بروتوكولى» سبب الكارثة.. والفيروس يتحور بعد تناول العقار وينتج نوعا جديدا لا يمكن علاجه □ ادعو «عماد» لسرعة الانتهاء من تشكيل «الهيئة العليا للدواء»

قال محبي عبيد، نقيب الصيدالة: «إن انتكاس العلاج بـ«السوفالدي» يثبت فشل «الهيئة العليا للدواء» في مراقبة جودة الدواء، مما قد يهدد حياة المرضى». وأضاف عبيد: «نحن نطالب وزير الصحة بتوفير علاج بديل للمرضى الذين يعانون من انتكاس العلاج بـ«السوفالدي»». وأكد عبيد: «نحن نطالب وزير الصحة بتوفير علاج بديل للمرضى الذين يعانون من انتكاس العلاج بـ«السوفالدي»».



قال محبي عبيد، نقيب الصيدالة: «إن انتكاس العلاج بـ«السوفالدي» يثبت فشل «الهيئة العليا للدواء» في مراقبة جودة الدواء، مما قد يهدد حياة المرضى». وأضاف عبيد: «نحن نطالب وزير الصحة بتوفير علاج بديل للمرضى الذين يعانون من انتكاس العلاج بـ«السوفالدي»».

هذا هو رأي نقيب الصيدالة، الذي انتقد فيه «الهيئة العليا للدواء» بسبب فشلها في مراقبة جودة الدواء. وأضاف عبيد: «نحن نطالب وزير الصحة بتوفير علاج بديل للمرضى الذين يعانون من انتكاس العلاج بـ«السوفالدي»».

المفروض أن يستمر العلاج من 3 إلى 6 أشهر حسب البرنامج العلاجي، وذلك بعد إجراء التحاليل، فيعوض المرضى ظهر عندهم الفيروس بالملايين، وبعد العلاج تبدأ الاستجابة للعلاج، ويقل عدد الفيروس، لكن بعد توقف العلاج فوجدنا 35% بالمائة منهم لم يستجيبوا للعلاج من إجمالى 100 بالمائة، وقد تحدث الانتكاسة بعد انتهاء العلاج بشهر أو شهرين.

قال محبي عبيد، نقيب الصيدالة: «إن انتكاس العلاج بـ«السوفالدي» يثبت فشل «الهيئة العليا للدواء» في مراقبة جودة الدواء، مما قد يهدد حياة المرضى».

هذا هو رأي نقيب الصيدالة، الذي انتقد فيه «الهيئة العليا للدواء» بسبب فشلها في مراقبة جودة الدواء. وأضاف عبيد: «نحن نطالب وزير الصحة بتوفير علاج بديل للمرضى الذين يعانون من انتكاس العلاج بـ«السوفالدي»».

المفروض أن يستمر العلاج من 3 إلى 6 أشهر حسب البرنامج العلاجي، وذلك بعد إجراء التحاليل، فيعوض المرضى ظهر عندهم الفيروس بالملايين، وبعد العلاج تبدأ الاستجابة للعلاج، ويقل عدد الفيروس، لكن بعد توقف العلاج فوجدنا 35% بالمائة منهم لم يستجيبوا للعلاج من إجمالى 100 بالمائة، وقد تحدث الانتكاسة بعد انتهاء العلاج بشهر أو شهرين.

قال محبي عبيد، نقيب الصيدالة: «إن انتكاس العلاج بـ«السوفالدي» يثبت فشل «الهيئة العليا للدواء» في مراقبة جودة الدواء، مما قد يهدد حياة المرضى».

إسلام المنشاوى دعا لمحاسبة المسؤولين عن استيراد العقار صيدلى «السوفالدي»: أعضاء فى لجنة الفيروسات لهم مصالح مع شركات الأدوية

رصدت في سفرها المرض، ورغم أن المرض يتحول إلى مرض مزمن، إلا أن المرض يهدد حياة المريض. وأضاف عبيد: «نحن نطالب وزير الصحة بتوفير علاج بديل للمرضى الذين يعانون من انتكاس العلاج بـ«السوفالدي»».



هذا هو رأي نقيب الصيدالة، الذي انتقد فيه «الهيئة العليا للدواء» بسبب فشلها في مراقبة جودة الدواء. وأضاف عبيد: «نحن نطالب وزير الصحة بتوفير علاج بديل للمرضى الذين يعانون من انتكاس العلاج بـ«السوفالدي»».

هذا هو رأي نقيب الصيدالة، الذي انتقد فيه «الهيئة العليا للدواء» بسبب فشلها في مراقبة جودة الدواء. وأضاف عبيد: «نحن نطالب وزير الصحة بتوفير علاج بديل للمرضى الذين يعانون من انتكاس العلاج بـ«السوفالدي»».

المفروض أن يستمر العلاج من 3 إلى 6 أشهر حسب البرنامج العلاجي، وذلك بعد إجراء التحاليل، فيعوض المرضى ظهر عندهم الفيروس بالملايين، وبعد العلاج تبدأ الاستجابة للعلاج، ويقل عدد الفيروس، لكن بعد توقف العلاج فوجدنا 35% بالمائة منهم لم يستجيبوا للعلاج من إجمالى 100 بالمائة، وقد تحدث الانتكاسة بعد انتهاء العلاج بشهر أو شهرين.

قال محبي عبيد، نقيب الصيدالة: «إن انتكاس العلاج بـ«السوفالدي» يثبت فشل «الهيئة العليا للدواء» في مراقبة جودة الدواء، مما قد يهدد حياة المرضى».



PRESS CLIPPING SHEET