

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Gomhoureya
DATE:	25-Novembe- 2015
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	600,000
TITLE :	Beware of taking medications during pregnancy to avoid potential fetal deformities
PAGE:	13
ARTICLE TYPE:	Drug-Related News
REPORTER:	Staff Report

احذري الأدوية أثناء الحمل لتجنبى طفلاً مشوهاً

مشكلات الغدة الدرقية خاصة للنساء اللاتي يعانين من مرض الغدة الدرقية هن أكثر عرضة لإنجاب أطفال يعانون من التشوهات لذلك من المهم عمل تحليل غدة درقية فى أول الحمل وأخيراً يحذر الدكتور عمرو حسن من استخدام المضادات الخاصة بالاكثئاب وعلى رأسها paroxetine والذي أثير حوله جدل واسع إزاء تسببه فى إقدام الأطفال والمراهقين على الانتحار قبل بضعة أشهر بالإضافة لعيوب أخرى منها أيضاً تشوهات الأجنة.



د. عمرو حسن

الزحف العمرانى.
وأشار حسن إلى أن من مخاطر تشوهات المواليد بشكل كبير أيضاً

فى النطفة أو الخلايا ومن هنا يكون من الخطأ تناول هرمونات مثبتة للحمل بصورة عشوائية لأننا بذلك قد نعمل على تثبيت حمل ليتبين من بعد وجود تشوهات خلقية به.
ومن العوامل التى قد تؤدى للتشوهات أو الإعاقة لدى الأطفال ملوثات الهواء خاصة فى الأماكن المغلقة ويمكن لجودة الهواء الذى نتنفسه أن يتدهور بسبب مصادر مختلفة مثل التدخين ومواد التنظيف أو تسخين الماء والحيوانات والغبار الذى يخرج من المصانع التى أصبحت متواجدة بين المنازل بسبب

أكد الدكتور عمرو حسن استشارى أمراض النساء والتوليد بطب قصر العينى أن تناول الأدوية حتى لو كانت فيتامينات أو أدوية تخسيس خاصة أدوية علاج البشرة من دون استشارة طبيب نساء.
وحذر من تناول هرمونات مثبتة للحمل بصورة عشوائية مؤكداً أن معظم التشوهات الجنينية تسقط من تلقاء نفسها فى مراحل مبكرة من الحمل وأحياناً قبل أن تدرك المرأة أنها حامل ويجب أن ندرك أن نحو ٧٠٪ من أسباب سقوط الحمل فى الأسابيع الأولى يعود إلى تشوهات