

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Hayat
DATE:	27-November-2015
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	267,370
TITLE :	Epididymitis
PAGE:	16
ARTICLE TYPE:	General Health News
REPORTER:	Staff Report

التهاب البربخ

■ يصيب التهاب البربخ سنوياً حوالي مليون رجل، معظمهم في المرحلة العمرية من ٢٠ إلى ٣٥ عاماً، وهو يشاهد في شكلين: حاد ومزمن. والالتهاب الحاد هو الأخطر لأنه يبدأ فجأة ويسبب ألماً وتورماً في كيس الخصية في شكل أكبر من الالتهاب المزمن.

وعندما يتعرض الرجل إلى التهابات في المسالك البولية يكون البربخ من بين أول الأعضاء التي يزورها بعد المتانة، وأشهر الجراثيم التي تصف وراء التهاب البربخ أربع: الكلاميديا، والمكورات البنية، والعصيات القولونية، والبكتيريا العنقودية.

ولدى وجود أدنى شك في التهاب البربخ فإنه يجب علاجه بالسرعة القصوى وبلا مفاطة، خصوصاً عند الشكوى من الحمى والتورم والألم في كيس الصفن، لأن التقاعس في العلاج يمكن أن يفسد المجال للالتهاب ليمتد إلى الخصيتين وبالتالي إلى الإصابات بالعقم.

والتهاب البربخ مرض شائع إلى حد ما، قد يشاهد في خصية واحدة أو في الخصيتين معاً، ويكون دوماً من منشأ جرثومي، ويتأفق في معظم الأحيان مع التهاب الخصية. ولا يجب إغفال التهاب البروستاتة لأنه قد يكون وراء التهاب البربخ.

والبربخ هو خزان الحيوانات المنوية، وهو أنبوب صلب وحلزوني الشكل يلتصق بالسطح العلوي الخلفي للخصية، ويتألف من ثلاثة أقسام: القسم الأعلى دائري يسمى بالراس، والقسم المتوسط مثث يدعى بالجسم، والقسم الأسفل رفيع يطلق عليه الذنب. ويبلغ طول البربخ في الحال الطبيعية خمس سنتيمترات، لكن في حال فردته يصبح طوله الفعلي حوالي ستة أمتار. ويتكون البربخ من أنابيب ملتوية يحيط بها نسيج ضام ومجموعة من الأوعية الدموية، وهو صلة الوصل بين الخصية والقناة الناقلة للحيوانات المنوية.