

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Menbar Al Tahrir
DATE:	07-December-2015
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	50,000
TITLE :	New drug launched to improve vision loss which affects 30% of diabetes patients – New drug offers effective treatment option for diabetic retinopathy
PAGE:	02
ARTICLE TYPE:	Drug-Related News
REPORTER:	Nehmedo Abdel Aziz

إطلاق عقار جديد لتحسين حالة فقدان الرؤية التي تصيب ٣٠٪ من مرضى السكر

٧,٥ مليون مصاب بالسكر في مصر عرضة للإصابة باعتلال الشبكية السكري والكشف المبكر ينقذ بصر أغلبية المصابين

العقار الجديد يوفر خياراً فعالاً لعلاج اعتلال الشبكية السكري

تعملو عبد العزيز

تم الإعلان عن توافر عقار جديد لعلاج اعتلال الشبكية السكري بمؤتمر صحفي عقد برعاية شركة باير هيلث كير وبمشاركة نخبة من كبار أساتذة أمراض الشبكية وأهم الجمعيات الطبية المتخصصة.

صرح الدكتور هاني حمزة، أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة القاهرة واستشاري الشبكية والجسم الزجاجي، يمثل عقار أفهيرست خطوة هامة في علاج اعتلال الشبكية السكري والذي يصيب حوالي ٣٠ مليون مريض على مستوى العالم، حيث يتيح خياراً إضافياً لمرضى السكر الذين يعانون من فقدان أو ضعف البصر ويمنحهم المرض وتحسين نظرهم بشكل مستدام. علماً بأن الحقن يكون متكرر في هذه الحالات لتحقيق النتائج المطلوبة. وذلك حسب ما اكتمت نتائج المرحلة الثالثة من الدراسات VIVID-DME، VISTA-DME، DME و VISTA-DME. أنه بعد عام واحد من تلقي العلاج بانتظام، تمكن المرضى من رؤية ١٠ حروف إضافية (سطين) إضافيين من الحروف في لائحة العلامات أثناء قياس النظر. وإضافة إلى ذلك احتاج ٣٣٪ من المرضى ٨ حقن سنوياً لاستعادة رؤية ٣ سطين. كما تحسن أكثر من نصف المرضى حيث استعادوا رؤية سطين على لائحة العلامات. والذي يجدر بالذكر أن عقار أفهيرست، والذي يُحقن بالعين مرة واحدة شهرياً لمدة خمسة أشهر مبدئياً، ثم يُحقن فيها بعد مرة كل

شهرين، يحد من نمو الأوعية الدموية غير الطبيعية في الشبكية من خلال عرقلة عامل نمو بطانة الأوعية الدموية، وهو أحد عوامل النمو الطبيعية في الجسم وله دور هام في الإصابة باعتلال الشبكية السكري. ومن خلال خفض معدلات نمو الأوعية الدموية الجديدة، ينخفض معدل التصريب أو يتوقف الانتشاح. كما يعمل أفهيرست على تثبيط بروتين مرتبط بالمرض يطلق عليه "عامل نمو المشيمية"، وهو أحد العوامل الهامة التي تسبب اعتلال الشبكية السكري.

وعلى الدكتور/ مجدى موسى قائلاً: يمثل عقار أفهيرست علاجاً فعالاً لاعتلال الشبكية السكري، فبينما العلاجات المتاحة حالياً والمضادة لعامل نمو بطانة الأوعية الدموية تعمل فقط على تثبيط بروتين VEGF-A، فإن عقار أفهيرست يعمل على تثبيط جميع الأنواع المختلفة لبروتين المشيمية، وذلك عند استخدام العلاج طبقاً للتوصيات المذكورة في الدراسات.

وشدد الدكتور/ هاني حمزة على ضرورة خضوع مرضى السكر للكشف الدوري على العين مرة كل عام ومتابعة مستوى السكر بالدم بانتظام قائلاً: "إن المرضى الذين يتم اكتشاف إصابته مبكراً يستطيعون السيطرة على المرض وللوقاية من فقدان البصر وتحقيق أفضل النتائج العلاجية".

إطلاق أحدث عقار لتحسين حالة فقدان الرؤية التي تصيب ٣٠٪ من مرضى السكر

٧,٥ مليون مصاب بالسكر في مصر عرضة للإصابة باعتلال الشبكية السكري والكشف المبكر ينقذ بصر أغلبية المصابين

العقار الجديد يوفر خياراً فعالاً لعلاج اعتلال الشبكية السكري

تعملو عبد العزيز

تم الإعلان عن توافر عقار جديد لعلاج اعتلال الشبكية السكري بمؤتمر صحفي عقد برعاية شركة باير هيلث كير وبمشاركة نخبة من كبار أساتذة أمراض الشبكية وأهم الجمعيات الطبية المتخصصة.

صرح الدكتور هاني حمزة، أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة القاهرة واستشاري الشبكية والجسم الزجاجي، يمثل عقار أفهيرست خطوة هامة في علاج اعتلال الشبكية السكري والذي يصيب حوالي ٣٠ مليون مريض على مستوى العالم، حيث يتيح خياراً إضافياً لمرضى السكر الذين يعانون من فقدان أو ضعف البصر ويمنحهم المرض وتحسين نظرهم بشكل مستدام. علماً بأن الحقن يكون متكرر في هذه الحالات لتحقيق النتائج المطلوبة. وذلك حسب ما اكتمت نتائج المرحلة الثالثة من الدراسات VIVID-DME، VISTA-DME، DME و VISTA-DME. أنه بعد عام واحد من تلقي العلاج بانتظام، تمكن المرضى من رؤية ١٠ حروف إضافية (سطين) إضافيين من الحروف في لائحة العلامات أثناء قياس النظر. وإضافة إلى ذلك احتاج ٣٣٪ من المرضى ٨ حقن سنوياً لاستعادة رؤية ٣ سطين. كما تحسن أكثر من نصف المرضى حيث استعادوا رؤية سطين على لائحة العلامات. والذي يجدر بالذكر أن عقار أفهيرست، والذي يُحقن بالعين مرة واحدة شهرياً لمدة خمسة أشهر مبدئياً، ثم يُحقن فيها بعد مرة كل