

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Akhbar Al Massai
DATE:	29-December-2015
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	150,000
TITLE :	New, long-acting diabetes treatment
PAGE:	08
ARTICLE TYPE:	Drug-Related News
REPORTER:	Staff Report

علاج جديد لـ «السكر» ممتد المفعول



■ المؤتمر الدولي الأول للغدد الصماء

الوظيفي لخلايا بيتا، مما يسمح بزيادة إفراز الأنسولين علاوة على أنه لا يؤثر على وظائف الكلى، وهو يماثل في تركيبه ٩٧٪ من الهرمون الطبيعي داخل الجسم، مما يقلل الأجسام المضادة وبالتالي الاحتفاظ بفعاليته داخل الجسم.

أتاحت تقنية تصنيعه إمكانية تناوله مرة واحدة يومياً بدون التقيد بمواعيد الطعام، مما يتيح الفرصة للمرضى ممارسة الأنشطة اليومية بصورة طبيعية، ويتميز بخفض خطورة التعرض للانخفاض الشديد في سكر الدم، وتحسين الأداء

نصف كوب مشروب سكري مثل العصير. وفي حالة الغيبوبة تلجأ فوراً إلى المستشفى، لأن أي تأخير يكون فيه خطورة شديدة على المريض. وأوضح الدكتور محمد البحراوي أن هناك علاجاً جديداً من الجيل الثاني من عقاقير الأنسولين

تأثيرها الضار على المريض من الناحية الصحية. جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي الأول للغدد الصماء والسكر الذي تنظمه الجمعية المصرية للغدد الصماء والسكر وتصلب الشرايين، بالتعاون مع الجمعية الأمريكية للغدد الصماء ويضيف الدكتور محمد البحراوي أستاذ الأمراض الباطنية والسكر بطب الإسكندرية إن غيبوبة انخفاض السكر تنتج عن نقص مستوى الجلوكوز في الدم، وتتمثل أهم أسبابها في تناول جرعة كبيرة من علاج السكر، أو عدم تناول الوجبات في موعدها. ومن أعراض انخفاض السكر في الدم فقدان الوعي، والعرق بغزارة، وشحوب في لون الوجه، وزيادة في ضربات القلب، والصداع، وزغلة في العين، ورعشة في الأطراف والإحساس بالهبوط العام، والإرهاق الشديد. ومن الأفضل في هذه الحالة أن نعمل المريض

مليون شخص في العالم. ويعتبر انخفاض مستويات السكر في الدم من الأمور المقلقة لدى الطبيب والمريض معا بسبب

أكد الدكتور فهمي أمارة أستاذ الغدد الصماء والسكر بطب الإسكندرية إنه يعاني من مرض السكر حوالي ٢٨٢