

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Ahram
DATE:	06-December-2015
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	1,000,000
TITLE :	Endoscopic silicon injection stops urinary reflux in children
PAGE:	21
ARTICLE TYPE:	NGO News
REPORTER:	Hossam Zaid

حقن «السليكون» بالمنظار لوقف الارتجاع البولي للأطفال

حسام زايد :

لدى الأطفال ... وليس كما هو مشاع خطأ أنه مرض نفسي ، لافتا الى أن العرض النفسي قد يحدث ولكن عقب الإصابة بالمرض وليس قبله. وأضاف أن علاج الطفل في هذه الحالات يعتمد على تنشيط مركز الإيقاظ أثناء النوم ليلا نظراً لأن جميع أجهزة القياس عمق النوم كشفت أن هؤلاء الأطفال المصابين بمرض التبول اللا إرادي "نومهم ثقيل"، لافتاً إلى أن العلاج يعتمد على تنبيه الطفل كل فترة أثناء النوم والنداء عليه في أول ساعتين من وقت النوم، كما يتم الاعتماد على استخدام بعض العلاجات مثل البخاخة التي تستخدم لتقليل نشاط المثانة. ومن جانبه قال الدكتور عبدالرحمن زهران، أستاذ جراحة المسالك البولية بكلية الطب جامعة الإسكندرية أنه حديثاً أصبح يتم الاعتماد على "الروبوت" في علاج حصوات الكلى والحالب وهي الطريقة الأسير للجراحة التي توفر وتحقق نتائج أكثر دقة للمريض و أقل في الأعراض الجانبية مقارنة بالتدخل الجراحي.

جدير بالذكر أن مؤتمر الجمعية المصرية لجراحي المسالك البولية الـ ٥٠ اختتم أعماله أول أمس بمشاركة ١٨ جمعية عالمية متخصصة في جراحة المسالك البولية، وبحضور ١٢٠٠ طبيب .

أعلن مؤتمر الجمعية المصرية الخمسون لجراحي المسالك البولية عن تطور علمي جديد لعلاج الارتجاع البولي في الأطفال باستخدام حقنة مرة واحدة باستخدام المنظار تحتوي على مادة السليكون يمكنها تحقيق الشفاء بنسب ، ويمكن استخدامها بديلاً عن العمليات الجراحية.

وأوضح الدكتور محمد عيسى، أستاذ جراحة المسالك البولية، بطب قصر العينين ورئيس الجمعية المصرية لجراحي المسالك البولية ورئيس المؤتمر أن الحقن لعلاج الارتجاع البولي لدى الأطفال يتم في فتحة أسفل الحالب من مادة السليكون لوقف ارتجاع الصمام مشيراً إلى أن ٥ ٪ من حالات زرع الكلى، جاءت نتيجة فشل كلوي بسبب الارتجاع البولي. وأضاف أن مادة السليكون وظيفتها إضافة سمك لجدار الحالب مما يعمل على وقف الارتجاع البولي ، فيما أكد أن ٨٠ ٪ من أمراض المسالك البولية، في الأطفال تعود إلى عيوب خلقية.

وأشار إلى أن نسب نجاح الحقن تقل عن الجراحة نوعاً ما حيث تصل نسب نجاح الحقن بالسليكون إلى ٨٠ ٪ ، بينما تصل نسب نجاح الجراحة إلى ٩٥ ٪.

وقال أن مرض التبول اللا إرادي من أهم أسبابه كسل مركز الإيقاظ