



## PRESS CLIPPING SHEET


PUBLICATION:	Al Ahram
DATE:	06-December-2015
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	1,000,000
TITLE :	Hopes and warnings regarding new HCV drug treatments
PAGE:	21
ARTICLE TYPE:	Drug-Related News
REPORTER:	Hatem Sedki

## الأمال والمحاذير من العلاجات الدوائية لفيروس «سي»

## 🎤 حاتم صدقی:

مع استمرار طرح مجموعة جديدة من أدوية علاج الفيروس الكبدى سي، كان من الطبيعى أن تتعاقد مصر على توفير هذه الأدوية. وتزايدت أمال المرضى في التخلص من الفيروس والشفاء التام منه، خاصة وانها تؤخذ بالفم ولفترات قصيرة، على عكس الأدوية السابقة.

ويقول د. حسنى سلامة أستاذ الجهاز الهضمى والكبد بطب القاهرة إن للأدوية الحديثة قواعد عامة وهامة يجب اتباعها والالتزام بها من جانب الأطباء والمرضى لتجنب أى نتائج عكسية كما يجب التنبه إلى أن الأدوية موجهة للتغلب على الفيروس الكبدى وليس المضاعفات الناتجة الالتهاب الناتجة عن الالتهاب الفيروسي مثل الاستسقاء أو الفشل الكبدى. وفيما يتعلق ببرنامج العلاج فلا يجب إعطاء هذه الأدوية منفردة على الإطلاق خاصة عقار سوفالدى حيث يتم العلاج وفقا لبروتوكولات من عدة أدوية يحددها الطبيب طبقا لحالة كل مريض وسنه



الطبيب عند حدوث أي مضاعفات والأمراض الأخرى التي يعاني منها. وبالنسبة لعقار داكلانزا، صحية، وكذلك المتابعة الدورية وإجراء التحاليل، كما يجب فهو عقار مهم وأمن ويحقق استشارة الطبيب عن تناول أي نتائج مبهرة مع سوفالدى فهو دواء أخر لعلاج مشكلة صحية أمن ومناسب لمرضى الكلى كما أخرى مثل الضغط أو السكر أن عقار هارفوني الذي ينتظره فمن المتعارف عليه أن أدوية الكبد الكثير من المرضى، هو عبارة قد تتفاعل مع الأدوية الأخرى عن عقاري سوفالدي وليديبسفير وتتسبب في مضاعفات صحية فى كبسولة واحدة وأن هناك حيث حذرت هيئة الغذاء والدواء علاجات ثلاثية أخرى مدمجة، الأمريكية أخيرا من إعطاء عقار وبالتالي من المهم التنبه إلى مدى كيوريفو - والمعروف دوليا التطور المتلاحق في العلاجات باسم عقار تكنيفي - لمرضى الدوائية ومدى ملاءمة كل دواء الفيروس الكبدى سي المصابين لحالة المريض، ويجب استشارة

دراسات دولية أن الدواء تسبب في إصابات شديدة بالكبد لـ ٢٦ مريضا من مختلف دول العالم تناولوا الدواء على مدار العام الحالى، وطالبت ميئة الغذاء والدواء بمتابعة المرضى الذين يعالجون بهذا الدواء عن قرب وتجنب منح العلاج لحالات التليف المتقدم من الدرجة الثالثة أو الرابعة حيث قد تؤدى لفشل كبدى كما سبق التحذير من مضاعفات تفاعل دواء أميودارون المنظم لضربات القلب مع دواء سوفالدی او هارفونی حيث تتفاعل الأدوية وتتسبب في مضاعفات جانبية وبطء نبضات القلب كما يجب استشارة الطبيب في البروتوكول الدوائي المناسب لعلاج الكبد خاصة للحالات التي تتناول علاجات دوائية أخرى لعلاج الضغط أو الغدة الدرقية أو أدوية قرحة المعدة أ والأدوية الخافضة لدهون الدم وغيرها وذلك تجنبا للأعراض الجانبية التي قد تهدد حياة المريض.

بتليف متأخر حيث أظهرت عدة