



PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Bawaba
DATE:	27-February-2016
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	20,000
TITLE:	Leg varicose veinstheir causes and ways of treating them
PAGE:	11
ARTICLE TYPE:	General Health News
REPORTER:	Staff Report

«الاستئصال الجراحي» الحل الأفضل

يعانى الكثير من الأشخاص من مشكلة ظهور دوالى الساقين، خاصة عندما تكون المرأة في مقتبل العمر، والتعرف ما تلك الشعيرات الدموية الظاهرة في تلك المنطقة، وأسبابها، وكيف نتعامل معها؟ يوضع لنا أحمد وإلى الساقين هي تعدد وتوسع في الأوردة السطحية، مع أزدياد غير طبيعي في المنحنيات والتعربات، وتعتبر دوالى الساقين من الأمراض الشائمة، حيث تؤثر على نسبة بالدوالي من خطوط صغيرة إلى أتابيب إلى اكياس كبيرة، على حسب درجة ارتجاع الصعابات الوريدية، التي تحافظ على صريان اللم الوريدية، التي تحافظ على صريان اللم الوريدي في اتجاء القلب، والدوالي نوعان على صريان الدم الوريدية في الدوالي والدوالي نوعان

على سريان الدم الوريدى فى اتجاه القلب، والدوالى نوعان -أولية وثانوية.
الدواتى الأولية تتبع عن ضعف وارتخاء فى جدران الدواتى الأولية تتبع عن ضعف وارتخاء فى جدران الأوردة، ويلعب العامل الوراش هنا دورا مهما فى هذا النوع، حيث نجد عائلات كاملة مصابلة بالدوالى، ويعتبر الوقوف لفترات طويلة من الأسباب التى تزيد من قابلية ظهور وازدياد دوالى السافين الأولية، أما دوالى السافين الطفات بالأوردة المعيقة، مما الثانوية فهى تتبع عن حدوث جلطات بالأوردة المعيقة، مما يؤدى إلى انصداد الوريد الرئيسي المسئول عن تصريف الدم الوريدى فى اتجاه الناحية اليمنى من القلب، وهنا الدم الوريدى فى اتجاه الناحية اليمنى من القلب، وهنا

يبحث الدم عن الأوردة الجانبية البديلة، حيث تتمدد وتزداد يبحث الدم عن الأوردة الجانبية البديلة، حيث تتمدد وتزداد الساعا فيما يسمى الدوالى الثانوية. توضع الدويل على أضعة الدويلر، والتى ويتم تشخيص وتقييم الدوالى على أضعة الدويلر، والتى الوريدية الرئيسية والفرعية، بالإضافة إلى الأوردة العميقة، علاج دوالى السافين يعتمد بشكل كبير على درجة الصمام بين الوريد الصافن الطويل والوريد الفخذي، في الصمام بين الوريد الصافن الطويل والوريد الفخذي، في صعفار السن، يفضل العلاج عن طريق حقن الدوالى على صعفار السن، يفضل العلاج عن طريق حقن الدوالى على ظهورها في أماكن آخري، خاصية إذا كان المريض يقف ظهورها في أماكن آخري، خاصة إذا كان المريض يقف لتترات طويلة، أما في حلالات الدوالى المتقدمة مع وجود الترجاع في المصامات الوريدية، فإن التدخيل الجراحى هو ارتجاع في العصامات الوريدية فإن التدخيل الجراحى هو الحل الحويد، ويتم ذلك باستئصال الدوالى من فتحات الحل الوحيد. ويتم ذلك باستثصال الدوالي من فتحات صغيرة متعددة وربط الصمامات الوريدية المرتجعة،

التى يتم تحديد مكانها باشعة الدوبلكس، ويتم وضع علامات على جلد المريض في الأماكن المعددة، ثم يتم سلت الوريد الصافن الطويل في المائلة من الركبة إلى المنطقة الأربية. في السنوات الأخيرة، ظهرت عدة طرق المنطقة الأربية. في السنوات الأخيرة، ظهرت عدة طرق للوريد الصافن الطويل لحرقه من الداخل، مما يؤدى إلى حديث تليف وإلغاء وجود أي تجويف للوريد، وذلك كبديل عن السلت الجراحي للوريد المسافن الطويل، والمشكلة في مذه التقنيات الجراحي للوريد المسافن الطويل، والمشكلة في المناطقة تحت الركبة، والتي يتم استثمالها ويعتبراحيا، حتى بعد عمل علاج بالليزر أو التردد الحرارى. ويغتبر السنتمال الجراحي مع رجاحيا المسامات المويل، هو اكثر طرق الملاج فعالية في عدم رجوع الدوالي بعد الاستثمال، مع المرتجمة وسلت الوريد الصافن الطويل، هو اكثر طرق وجود تحسن في الأعراض التي كان يعاني منها المريض قبل التدخل الجراحي.

في حالة الدوالي البسيطة ذات الحجم الصغير خاصة في صغار السن، يفضل العلاج عن طريق حقن الدوالي على جلسات، تتبع بارتداء شراب طبي خاص للدوالي، لمنع ظهورها في أماكن أخرى

