

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Sharq Al Awsat
DATE:	22-January-2016
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	200,000
TITLE :	Analgesics and the heart
PAGE:	19
ARTICLE TYPE:	Drug-Related News
REPORTER:	Dr. Hassan Mohamed Sandakgy

الاستشارات

الرياض، د. حسن محمد صندجي

مسكناً للألم والقلب

* هل يزيد تناول العقاقير المسكّنة للألم والمضادة للالتهاب غير الستيرويدية من خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتة الدماغية؟

محمود بـ. الإمارات.

- هنا ملخص الأسئلة الواردة في رسالتكم حول تأثيرات تناول نوبيات بروفين وفولتارين وغيرها من فئة الأدوية غير الستيرويدية ذات القدرة على تسكين الألم وتهيئة الالتهابات في الجسم.

للإجابة بشكل مختصر في بداية الحديث: نعم. وبالفعل فإن تناول هذه العقاقير المسكّنة للألم والمضادة للالتهابات، والتي تستخدّم عادةً وبشكل واسع ومن قبل الكثيرون لعلاج الألم والالتهابات في المفاصل، قد يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية. وتشتمل الأمثلة عليها عقار أيبوبروفين مثل أفييل وموترین وغيرهما، وعقار تابلووكسین، وعقار ديكلوفيناك مثل فولتارين وغيرها، وعقار كوكس (ذين مثل سيلبريسن وغيره). ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الابحاث لتحديد ما إذا كان بعض المسكّنات هي أكثر أو أقل احتمالاً لزيادة هذه المخاطر من غيرها.

ولاحظ معى أنه ورغم أن الأسبيرين هو نوع من الأدوية المضادة للالتهاب والمسكّنة للألم، فإن لا يبدو أن تناوله يترافق مع ارتفاع خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتة الدماغية.

والشخص الذي يأخذ هذه النوعية من العقاقير المسكّنة للألم والمضادة للالتهاب ولديه أمراض القلب والشرايين أو لديه عوامل خطورة الإصابة بها، يكون أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية من الشخص الذي يأخذ هذه المسكّنات وليس لديه مرض القلب والأوعية الدموية. ولذا من الضروري ملاحظة ضرورة عدم الإسراف في تناول هذه الفتنة من الأدوية.

والممساعدة في تخفيف آلام المفاصل أو آلام المفاصل فإن من الممكن الاستفادة من وسائل علاجية أخرى مثل الكمامات الباردة أو الدافئة أو العلاج الطبيعي، أو اللجوء إلى أنواع مختلفة من مسکنات الألم كعقار باندول واسيتامينوفين تايبلينول. وهي الأدوية التي ليس لها تأثيرات قوية وضارة على المعدة ولا ترفع احتمالات الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتة الدماغية. ومن الضروري أيضًا أن على الأشخاص الذين يتناولون الأسبيرين بانتظام تخفيف تناول العقاقير الأخرى من فئة الأدوية غير الستيرويدية ذات القدرة على تسكين الألم وتهيئة الالتهابات نتيجة لاحتمالات حصول تفاعلات سلبية مع الأسبيرين، مما قد يؤثر سلبًا على قدراته على المساعدة في منع النوبات القلبية.