

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Ahram
DATE:	24-January-2016
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	1,000,000
TITLE :	Age of patients suffering from bone marrow fibrosis in Egypt falls
PAGE:	22
ARTICLE TYPE:	General Health News
REPORTER:	Suhar Hedayat

انخفاض أعمار مرضى تليف النخاع العظمى بمصر

سهير هدايت

والإحساس بسرعة الإمتلاء، عند الأكل وبالتالي خسارة الوزن بسرعة. وتحدث د. فتحي خضير عميد طب قصر العيني عن ضرورة رفع الوعي لدى المجتمع المصري بعرض تليف النخاع العظمى من ناحية التشخيص السليم مما يؤدي للعلاج الناجح، ووجه د. خالد مكي وكيل الكلية الدعوة للمنظمات المجتمعية المدني للتعاون مع كلية طب قصر العيني لزيادة الاهتمام بهذا المرض وتسويل الطرق الحديثة في التشخيص والعلاج. كما أكد د. شريف ناصح أمين مدير مستشفى قصر العيني حرصهم على مواكبة التطور في مجال علاج أمراض الدم والوصول إلى المستويات الطبية العالمية عبر تطبيق أحدث تقنيات التشخيص والعلاج.

العظمى الذي نظمته الجمعية المصرية لأمراض الدم بمشاركة المجموعة الدولية لرعاية مرضى تليف النخاع العظمى أم دي انرسون بالولايات المتحدة الأمريكية أحدث تقنيات العلاج والمساهمة في التوعية بمخاطر المرض. أوضحت د. ميرفت مطر أستاذ أمراض الدم بطب قصر العيني أن مرض تليف النخاع العظمى يحدث نتيجة لاستبدال النخاع بخلايا أخرى تعرف بالنسيج الندي، وهو ما يسبب عدم قدرة النخاع العظمى على إنتاج خلايا دم كافية، وبالتالي تضخم الطحال والاصابة بالأنيميا ونقص خلايا الدم البيضاء، والصفائح الدموية، مشيرة الي أن أعراض المرض هي الإحساس بالإرهاق وآلم البطن وتحت الضلوع والعضلات والعظام

تشير الإحصائيات العالمية إلى أن مرض النخاع العظمى يصيب ١ من كل ١٠٠ ألف شخص على مستوى العالم ويتراوح متوسط عمر الإصابة للمريض ما بين ٥٠-٦٠ عاماً، بينما في مصر يصاب بعض الأشخاص في سن مبكرة بين ٢٠-٣٠ عاماً، وذلك في الأفراد الذين ينتجون كميات غير كافية من كريات الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية. وبعد النخاع العظمى أحد الأمراض النادرة بالغة الخطورة، التي تحتاج إلى توعية المرضى وأسرهم ومعالجهم بكيفية علاج هذا المرض النادر والتعامل معه على كافة المستويات سواء الشعبية أو الحكومية. وقد ناقش المنتدى الأول لمرضى تليف النخاع