

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Dostour
DATE:	2-March-2016
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	230,000
TITLE :	Ulcerative colitis incidence rates in Egypt up to 2'
PAGE:	11
ARTICLE TYPE:	NGO News
REPORTER:	Staff Report

PRESS CLIPPING SHEET

ارتفاع معدلات الإصابة بـ «القولون التقرحي» ٢٠٪ في مصر



لبرنامج عيش وشركة أبفى، حاضرها
الدكتور عمرو فطين - أستاذ أمراض الجهاز
الهضمي والكبد بطب عين شمس، وفتح باب
المناقشة للرد على كل التساؤلات الخاصة
بكل المرضى، مشيراً إلى أن المصاب
بأمراض التهابات القولون المناعية يعاني
من ارتفاع أسعار العلاج، حيث يضطر
المريض لاستخدام أدوية بيولوجية عن
طريق الحقن باهظة الثمن بعد فشل الأدوية
المثبتة للمرض أو في الحالات الشديدة،
وهذه الأدوية لا يستطيع المريض تحمل
نفقاتها.

وأكدت الدراسات التي أجريت حتى الآن،
أن سبب مرض كرون والتقرحي غير معروف
حتى الآن، حيث إن هناك عدة أسباب قد
تتضافر معاً لظهور هذا المرض ومنها:
عوامل وراثية، عوامل بيئية وجراثيم معوية..
وقد يتأخر تشخيص مرض كرون والتقرحي
أو يتم تشخيصهما بالخطأ وذلك لتشابه
أعراضهما مع كثير من أمراض الجهاز
الهضمي، حيث إن نسبة وعي المجتمع
بأعراض ومسببات المرض ليست كبيرة بما
يكفي للتوجه للطبيب المختص في مرحلة
مبكرة من المرض.

مرض كرون ومرض التهاب القولون
التقرحي، يعدان من أهم العوامل وأخطرها
التي تسبب التهابات الجهاز الهضمي، وتبلغ
نسبة الإصابة بمرض كرون والتقرحي في
مصر نحو ٢٪ - أي حوالي مليون وثمانمائة
ألف مصاب كل على حدة -، وقد يصيب مرض
كرون أي جزء من الجهاز الهضمي، من الفم
وحتى الفتحة الشرجية، أما التهاب القولون
التقرحي فيصيب القولون بشكل رئيسي. كما
أن مرض كرون يعد أكثر شراسة من مرض
إلتهاب القولون التقرحي، ويتشابه كلاهما في
كثير من الأعراض وطرق العلاج، ويتم تأكيد
التشخيص باستخدام منظار القولون لمعرفة
ما إذا كان يعاني منه المريض هو كرون أم
التهاب القولون التقرحي وكلاهما يمكن أن
يصيب كل الأعمار، ويكون الإنسان أكثر عرضة
للإصابة في العقد الثالث من العمر.
وأصبح رفع الوعي الصحي لدى فئات
المجتمع بمرض كرون والتقرحي ضرورة
ملحة، حيث إن زيادة الوعي والتعرف على
أعراض المرض يعد أول خطوة على طريق
العلاج وتحسين جودة حياة المريض وإنتاجيته
وممارسة دوره الطبيعي في المجتمع.
وفي هذا الإطار عقدت ندوة تثقيفية



PRESS CLIPPING SHEET