

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Ahram
DATE:	06-March-2016
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	1,000,000
TITLE :	25% expected increase in prostate cancer cases in 2020
PAGE:	14
ARTICLE TYPE:	General Health News
REPORTER:	Hossam Zayed

في دراسة حديثة

٢٥٪ زيادة متوقعة للإصابة بأورام البروستاتا في عام ٢٠٢٠

« كتب - حسام زايد :

صعوبة في التبول وكثرة التبول وضعفًا جنسيًا. وأوصى باجراء فحص دم بسيط للرجال الذين بلغوا الخمسين من عمرهم كحد إجراء الكشف المبكر عن سرطان البروستاتا. وأضاف أن دراسة جديدة حول العلاجات الحديثة أظهرت أن علاج مضاد الأندروجينات ساهم في تقليل مخاطر الوفاة بنسبة ٢٩٪ لدى الرجال المصابين بسرطان البروستاتا المنتشر المقاوم للاستئصال، كما أن هذا العلاج ساهم في إبطاء أو إيقاف نمو الورم السرطاني لدى ٥٩٪ من المرضى، مما أخرج من حاجتهم إلى الخضوع للعلاج الكيميائي بمعدل ١٧ شهرًا. لافتًا إلى أن هذا النوع الجديد من العلاج يستهدف مباشرة إشارات مستقبل الأندروجينات. وعلق الدكتور محمد جالودي، الطبيب الممارس ورئيس قسم الأورام في مستشفى توام في مدينة العين، الإمارات العربية المتحدة، أن الحالات لا تلجأ للطبيب إلا في مراحل متأخرة من المرض، وهو أمر سيء نظرًا لأن هناك فرصًا كبيرة للعلاج في المراحل المبكرة.

الأمريكية. إلا أن نسبة الوفيات أعلى ٥ أضعاف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عنها في الولايات المتحدة الأمريكية. جاء ذلك خلال القمة الإثلية لطب الأورام وأمراض الدم والتي عقدت أخيرًا بدبي لدعم مرضى سرطان البروستاتا. وأوضح الدكتور محسن مختار، أستاذ طب الأورام السرطانية الإكلينيكية في كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة ورئيس الجمعية المصرية لدعم مرضى السرطان أنه يمكن تجنب الإصابة بسرطان البروستاتا الذي يعد ثالث سبب للوفاة بين الأمراض السرطانية بالاعتماد على الأغذية منخفضة الدهون، والزواج. كما أن سهولة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية وزيادة الوعي أيضا يمكنها المساهمة في الاكتشاف المبكر للمرض ونجاح العلاج. وقال إن سرطان البروستاتا هو السرطان الذي يصيب غدة البروستاتا في الجهاز التناسلي الذكري، ويؤثر في غالبية الحالات على الذكور الذين تزيد أعمارهم على ٥٠ عامًا. وتتضمن الأعراض

أعلن مجموعة من الأطباء المتخصصين في علاج الأورام نتائج دراسات حديثة أظهرت أن هناك زيادة متوقعة في نسبة الإصابة بمرض سرطان البروستاتا إلى ٢٥٪ بحلول عام ٢٠٢٠ حيث سجلت ٢٩ ألف حالة عام ٢٠١٢ ومن المتوقع أن ترتفع بين الرجال فوق ٦٥ عامًا إلى ٢٦ ألف حالة عام ٢٠٢٠. كما سجل معدل الوفيات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ١٥.٤٢٢ حالة وفاة ومن المتوقع أن يرتفع إلى ١٩.٨٦١ حالة وفاة بحلول عام ٢٠٢٠ وفقًا للدراسات الأخيرة التي أجريت في عدة دول من بينها مصر. فيما أكدت الدراسات أن النظام الغذائي يعد من أحد أكثر العوامل التي تؤثر في ارتفاع معدلات الإصابة بأورام البروستاتا، وأن نظم الغذاء الغربية والتي تعتمد على تناول اللحوم والألبان بكثرة، و تنخفض فيها الاعتماد على الفواكه والخضراوات تساهم في زيادة المعدلات، وتشير الأرقام إلى أن معدل الإصابة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يقل بمعدل ٥ أضعاف تقريبًا عنه في الولايات المتحدة