



PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Shorouq
DATE:	05-March-2016
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	280,000
TITLE:	Alternative or generic drugsare they as effective?
PAGE:	15
ARTICLE TYPE:	Drug-Related News
REPORTER:	Staff Report

كثيرا ما يواجه المريض إشكالا حقيقيا حينما يتاول الصيدلي التذكرة الطبية فيسأله إذا ما كان مصرا على الدواء الذي وصفه الطبيب أو أنه قد يضل دواء آخر بديلا أقل سعرا وله نفس الأثرا وقعت لذا أرجو أن تتفضلي بشرح القرق بين الدواء الأصلى القوق بين الدواء الأصلى والبدائل. هل للبديل نفس القعول؟ هل له مضاعفات المعادة وإذا ما كان مطابقا المحلى المادا الموارفي المحل المادا الموارفي المحل المادا هو أرخصي أحمد سالم الوتبدى.

الأدوية البديلة تشترك مع الدواء معول الدواء ومدة تأثيره أو طريقة تكسيره في الأدوية المعروفة فإن الشركة

الأصلى في استخدام المادة الفعالة التي تعالج

المرص بنفس قوة التركيز لذا من الطبيعى أن يكون للدواء البديل ذات الخصائص العلاجية

للدواء الأصلى. ولكن لا يمكننا ان نتحدث عن

تطابق كامل بين الدواء الأصلى والبديل إذ إن

على سبيل المثال المادة الفعالة التي يحتويها

الدواء البديل رغم أنها ذات المادة الفعالة إلا

أن مصدرها قد يختلف. أبضا ربما اختلفت

خطوات تصنيع الدواء أو المواد المضافة للمادة

الفعالة: كل هذا بلا شك قد يخلق بعضا من

الاختلافات التي قد ينجم عنها اختلاف في قوة

مفعول الدواء ومدة تأثيره أو طريقة تكسيره في الكيد وإفرازه من الكلي.

هناك أدوية يجب أستخدامها الأصلى منها خاصة أدوية أمراض القلب والأوعية الدموية والأدوية المخفضة لنسب الكرليسترول في الدم. أما معظم الأدوية البديلة فيمكن استخدامها في أمان بعد مراجعة الطبيب.

الأدوية البديلة مناعة رائجة الآن وربما بمكن رصد حركتها المطردة في بلاد الهند وبلاد الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية إذ إنها بالفغل توفر بدائل رخيصة نسبيا للأدوية الأصلية، حينما ينتهى حق الملكية الفكرية لأحد

الأدوية المعروفة فإن الشركة المنتجة له قد تغطى حق تصنيعه تحت اسم آخر لشركة أخرى.

تراقب الأدوية البديلة من وكالة الغذاء والدواء تراقب الأدوية البديلة من وكالة الغذاء والدواء الأمريكية فتشترط على الشركة المنتجة للدواء البديل أن تعطى مبررات كافية على أن الدواء البديل تتحقق فيه الكفاءة البيولوجية والعلاجية نلمادة الفعالة الموجودة في الدواء الأصلى بنفس درجة الفاعلية ونفس الأثار الجانبية، يشترط أيضا أن تجرى دراسة بحثية قبل استخدامه تجاريا على خمسمائة مريض على الأقل لثلاثة أشهر إلا أدوية القلب فالتجارب على أدويتها البديلة اكثر صرامة.