

## PRESS CLIPPING SHEET

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| <b>PUBLICATION:</b>  | <b>Akhbar Al Youm</b>        |
| <b>DATE:</b>         | <b>05-March-2016</b>         |
| <b>COUNTRY:</b>      | <b>Egypt</b>                 |
| <b>CIRCULATION:</b>  | <b>1,300,000</b>             |
| <b>TITLE :</b>       | <b>Meningitis</b>            |
| <b>PAGE:</b>         | <b>04</b>                    |
| <b>ARTICLE TYPE:</b> | <b>General Health News</b>   |
| <b>REPORTER:</b>     | <b>Dr. Ahmed Abdel Salam</b> |

## PRESS CLIPPING SHEET

**طبيب الصحة**



**يقلم:**  
**د. أحمد عبد السلام**  
DR.A.ABDELSALAM@HOTMAIL.COM

**الحمى الشوكية**

الحمى الشوكية أو التهاب السحايا تعني الإصابة بالتهاب في الأغشية المحيطة بمخ الإنسان مما قد يسبب التهابات بالأنفخاع الشوكي نفسه كما يمكن أن يتسبب أيضا في الإصابة في المخ أو الحبل الشوكي.

تحدث الإصابة بسبب عدوى فيروسية، أو بكتيرية (الأكثر انتشاراً) وذلك عن طريق إفرازات الفم والأنف لشخص مصاب بنفس المرض من خلال العطس أو السعال وتزيد الإصابة في فصل الصيف إلا أنها ممكن أن تحدث في أي وقت من أوقات السنة ويعتبر الأطفال والمراهقون الأكثر تعرضاً للإصابة بالتهاب السحايا الذي من الممكن أن تؤدي مضاعفاته إلى الوفاة في حالة التأثير على الأعصاب والعضلات الخاصة بالتنفس.

أعراض المرض تبدأ بارتفاع في درجة الحرارة ولا تستجيب للعلاج مع تيبس في الرقبة وتصلب في العمود الفقري أو تشنجات عامة بالجسم وتختلف بعد ذلك الأعراض حسب الحالة فيمكن أن تحدث مضاعفات تؤدي إلى ضعف في بعض أطراف الجسم أو جميعها مع صعوبة في الكلام أو ضعف في النظر أو حول العينين أو فيء مستمر وذلك حسب المنطقة المصابة بالمخ.

حالة الحمى الشوكية تعتبر حالة طبية طارئة تستلزم التوجه إلى قسم الطوارئ بأقرب مستشفى ويتم التأكد من التشخيص عن طريق تحليل السائل من الأنفخاع الشوكي ومعرفة نوع البكتيريا المسببة للإصابة بعد إجراء عملية بزل من المنطقة القطنية والعجزية ثم تتم إجراء المزرعة وإعطاء المضاد الحيوي المناسب، كما يتم إجراء أشعة مقطعية على المخ للتأكد من الإصابة ومعرفة المنطقة التي بها التهابات ومضاعفاتها ومدى تأثيرها على الجسم وتجرى بعض الفحوص الأخرى مثل الرنين على الحبل الشوكي وقياس سرعة توصيل الأعصاب.

العلاج يكون بالمضاد الحيوي المناسب عن طريق المزرعة مع خافضات الحرارة والعلاج الطبيعي وإعادة تأهيل للمريض إذا حدث ضعف شديد وإجراء التدخلات حسب كل حالة على حدة.

النصيحة هي البعد عن الأماكن المزدحمة والمغلقة مع أخذ التطعيم في حالات السفر إلى الأماكن المزدحمة كما يحدث في العمرة والحج.