

## PRESS CLIPPING SHEET

|                      |                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>PUBLICATION:</b>  | Al Dostour                                                   |
| <b>DATE:</b>         | 04-May-2016                                                  |
| <b>COUNTRY:</b>      | Egypt                                                        |
| <b>CIRCULATION:</b>  | 230,000                                                      |
| <b>TITLE :</b>       | Helmy Abaza: Wrong use of HCV drugs leads to viral mutations |
| <b>PAGE:</b>         | 11                                                           |
| <b>ARTICLE TYPE:</b> | NGO News                                                     |
| <b>REPORTER:</b>     | Faten El Khadawy                                             |

## PRESS CLIPPING SHEET

### قسم اجقراط للأطباء

أقسم بالطبيب أبولو وأسكليبيوس وهييجا  
ويانكيا وجميع الأرباب والريبات، وأشهدهم،  
بأنى سوف أنفذ قدر قدرتي واجتهادى هذا  
القسم وهذا العهد، وأنعهد أن أعطى نصيبى من  
العلم للجميع وللتلاميذ الذين قبلوا بالعهد  
وأخذوا على أنفسهم القسم طبقاً لقانون  
الطبيب.  
ولن أعطى عقاراً مميتاً لأى إنسان إذا سألتنى  
إياه، ولن أعطى اقتراحاً بهذا الشأن، وكذلك لن

### كبسولة

يعتبر مرض خشونة المفاصل من أخطر  
مسببات الإعاقة على مستوى العالم حيث تشير  
الدراسات إلى أن هناك ٦,٩% من الرجال و١٨%  
من السيدات ممن تخطوا عمر الستين مصابون  
بخشونة المفاصل وهناك ما يقرب من ١%  
من سكان العالم مصابون بالروماتويد.

### خلال منتدى الإسكندرية الثانى للالتهاب الكبدى الوبائى سى

## حلمى أباطة: سوء استخدام أدوية فيروس سى يؤدي لتحول الفيروس

المصابين بفيروس سى الحاد، والذي أصبح علاجهم أسهل بالبروتوكولات الحديثة ولفترة قصيرة من ٨ إلى ١٢ أسبوعاً تؤدي للقضاء على الفيروس بنسبة ١٠٠%، وأشار إلى أن منتدى الإسكندرية الثانى للالتهاب الكبدى الوبائى سى ناقش الانتكاسة فى فيروس سى وكيفية الاستخدام الأمثل للأدوية المتوفرة فى مصر، كما ناقش إمكانية زيادة فترة العلاج لمدة ٢٤ أسبوعاً بدلاً من ١٢ أسبوعاً فى الحالات المتوقعة حدوث انتكاسة فيها، والتي من شأنها أن تؤدي للقضاء على الانتكاسات وعدم حدوث تحول بالفيروس. وأكد د. يسرى طاهر أن المنتدى خرج بعدة توصيات وهى: أن الأدوية المتوفرة حالياً مؤثرة وقوية ولها نتائج مؤثرة فى علاج فيروس سى، استخدام الأدوية بطريقة منضبطة طبقاً للبروتوكولات العالمية ممكن أن يصل بالنتائج إلى ٩٠%، يجب متابعة المرضى لمدة ٣ أشهر.

كتبت - هاتن خديوى،  
قال الدكتور حلمى أباطة، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بكلية طب جامعة الإسكندرية، ورئيس الجمعية المصرية لأمراض الكبد والجهاز الهضمى بالإسكندرية، إن الانتكاسات بعد الحصول على العلاج قد تؤدي إلى تحول الفيروس بمعنى أنه يفقد الشكل المتعارف عليه وبالتالي يشكل مناعة من العلاج. وأكد أن أسباب تطور الفيروس ترجع لسوء استخدام أدوية فيروس سى، بالنسبة للجراحة المستمرة، وسوء البروتوكول المستخدم للعلاج، والشخص المناسب للعلاج وفقاً لحالته الصحية من حيث إصابته بتليف فى الكبد أو استسقاء أو غيبوبة كبدية، وعدم التزام المريض بالعلاج، فأى خطأ فى العلاج قد يؤدي إلى عدم استجابة المريض للعلاج أو تطوره. جاء ذلك خلال منتدى الإسكندرية الثانى للالتهاب الكبدى الوبائى سى، والذي تنظمه الجمعية المصرية لأمراض الكبد والجهاز الهضمى والأمراض المعدية فى الإسكندرية بالتعاون مع وحدة الكبد بجامعة الإسكندرية، تحت عنوان «كيفية حدوث تحورات فى الفيروس أو مقاومة الفيروس للعلاج».

### يسرى طاهر: الكيوريفو يحقق نسب نجاح ١٠٠% فى القضاء على فيروس سى بإضافة الريبافيرين

وأوضح أن النتائج النهائية للمريض تظهر بعد الانتهاء من الكورس العلاجي ٣ أشهر، وبالرغم من وجود نتائج إيجابية إلا أن هناك نتائج سلبية لحالات لم تستجب للعلاج، الأمر الذى يستلزم إعادة النظر ومعالجة السبلات والوصول لنسبة استجابة ١٠٠% والتي تؤدي فى النهاية إلى القضاء على فيروس سى، مطالب علماء البيولوجى بدراسة تلك الظاهرة وتأثيرها على المجتمع.

وقال الدكتور يسرى طاهر أستاذ الكبد والجهاز الهضمى ورئيس وحدة الكبد بجامعة الإسكندرية، ورئيس المنتدى،

وأكد أن هناك نسبة من المرضى يرتد لهم الفيروس حتى بعد الحصول على بروتوكول المنتكسين «السوفالدي» دكلانزا + ريبافيرين لمدة ٦ أشهر، إلا أنه يمكن استخدام عقاقير أخرى مثل الهافرون أو الكيوريفو فى الحالات التى لم يحدث لها انتكاسة من نفس العقار، ويمكن استخدام الكيوريفو مع الريبافيرين لمدة ٣ أشهر أو منفرداً لمدة ٦ أشهر. وتابع أباطة أن نسب الانتكاسة قليلة ولكنها موجودة، والتي تؤدي إلى زيادة انتشار نسبة الإصابة بسرطان الكبد لدى المرضى، وانتشار الفيروس فى المجتمع نتيجة لعدم شفاء المريض واحتكاكه

وتابع، الأدوية القوية المصنفة رقم ١ فى الترتيب الطبى للمؤلة تؤدي لعدم حدوث انتكاسة للفيروس، وتم الاتفاق مع الشركة المنتجة للكيوريفو بتوفيره بمبلغ ٣٢٠٠ فى الصيدليات كتكلفة شهرية للعبوة ويؤخذ العلاج لمدة ٣ أشهر. ومن التوصيات أيضاً: متابعة حالات سرطان الكبد بعد علاجها من فيروس سى متابعة دقيقة حتى يتسنى اكتشاف الارتجاع المزمن نظراً لظهور بعض الأبحاث العالمية التى تشير إلى إمكانية حدوث الارتجاع المبكر للأورام بعد علاج الفيروس برغم من فلة عدد تلك الحالات، بالإضافة إلى أهمية مزار الريبافيرين فى العلاج لتجنب حدوث الانتكاسة والتحول الجينى للفيروس. وأوصى المنتدى بإجراء دراسات إكلينيكية حثيثة على المرضى المصريين لتبيان النتائج النهائية للعلاج ومقارنته بنتائج العلاج العالمية.