

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Gomhoureya
DATE:	02-May-2016
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	600,000
TITLE :	World Health Organization: Non-infectious diseases are a threat to women's lives
PAGE:	09
ARTICLE TYPE:	General Health News
REPORTER:	Staff Report

منظمة الصحة العالمية: الأمراض غير المعدية.. تهدد حياة النساء

وتحدث وفيات الأمهات المباشرة نتيجة الإصابة بمضاعفات الولادة في أثناء الحمل والولادة وتنتج وفيات الأمهات غير المباشرة عن مرض غالبا ما يكون موجودا بشكل مسبق إلا أنه يتفاقم بسبب الحمل وتشتمل الأمراض على حالات الإصابة بالأمراض غير المعدية على سبيل المثال داء السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية فضلا عن الأمراض المعدية والطفيلية مثل عدوى فيروس عوز المناعة البشري والسل والتهاب الكبد الوبائي والانفلونزا والملاريا. وبعد أن تم تطبيق الطريقة الجديدة على البيانات الواردة من فترة الدراسة التي استمرت ثماني سنوات وجد الباحثون أن وفيات الأمهات الناتجة عن أسباب توليدية مباشرة انخفضت من ٤٩.٤ إلى ٣٢.١ لكل مائة ألف من المواليد على قيد الحياة خلال فترة الدراسة وأن وفيات الأمهات الناتجة عن أسباب غير مباشرة ظلت ثابتة بمعدل ١٢.٢ حالة وفاة لكل مائة ألف من المواليد على قيد الحياة في عام ٢٠٠٦ مقارنة بمعدل يبلغ ١٣.٣ حالة وفاة لكل مائة ألف من المواليد على قيد الحياة عام ٢٠١٣ وكما هو الحال في العديد من بلدان متوسطة الدخل شهدت المكسيك زيادة سريعة في مستويات الإصابة المرتفعة بأمراض الكوليسترول والبدانة في السنوات الأخيرة وهذا الأمر يجعل النساء اللاتي بلغن سن الإنجاب أكثر عرضة للإصابة بأمراض إرتفاع ضغط الدم وداء السكري من النوع الثاني الموجود سلفا.

ستعلن منظمة الصحة العالمية «who» بجنتيف اليوم نتائج دراسة علمية حول تأثير التهديد المتزايد للأمراض غير المعدية على بقاء النساء على قيد الحياة أثناء الحمل والولادة حيث أوضحت الدراسة انخفاض معدلات وفيات النساء في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل نتيجة ظروف مرتبطة بالحمل والولادة بالمقارنة بالمستويات التي كانت سائدة قبل عشر سنوات مضت وتسلط الدراسة الضوء على الخطر الناشئ من إمكانية تسبب الأمراض غير المعدية في تقويض التقدم الذي أحرز مؤخرا في جهود تحسين معدل بقاء الأمهات على قيد الحياة.

●● وصرح الدكتور المشارك في الدراسة رافائيل لوزانو من المعهد الوطني للصحة العامة في المكسيك قائلا: نحن نكسب المعركة ضد الأسباب التقليدية لوفيات الأمهات مثل الإصابة بالنزف التالي للوضع ولكن ليس ضد الأسباب غير المباشرة لوفيات الأمهات وتوصل فريق العمل في الدراسة العلمية لنتائج تمثل إضافة للأدلة المتزايدة عن أسباب الوفيات أثناء الحمل في المكسيك وهي متفقة مع أحدث التحليلات العالمية التي تفيد بأن أكثر من ربع وفيات الأمهات في جميع أنحاء العالم تحدث نتيجة التعرض لأسباب غير مباشرة إن وفاة الأم أي تفارق الحياة أثناء الحمل أو خلال ٤٢ يوما بعد الوضع يمثل مقياسا مهما لمستوى التنمية في البلد. ومدى الجودة النوعية لأداء النظام الصحي بها.