

## PRESS CLIPPING SHEET

<b>PUBLICATION:</b>	Al Akhbar Al Massai
<b>DATE:</b>	10-May-2016
<b>COUNTRY:</b>	Egypt
<b>CIRCULATION:</b>	150,000
<b>TITLE :</b>	IVF is the last resort for infertility
<b>PAGE:</b>	08
<b>ARTICLE TYPE:</b>	General Health News
<b>REPORTER:</b>	Staff Report

### الحقن المجهري علاج أخير للعقم

ولكن توجد الحيوانات المنوية بداخل الخصية أو بريخ الخصية سواء كان ذلك بسبب انسداد الحالب المنوي أو عدم وجوده بسبب عيب خلقى أو التهاب بريخ الخصية أو ضعف إنتاج الحيوانات المنوية من خلايا الخصية والذي قد ينتج عن أسباب مختلفة.

- ٢- حالات العقم غير المعروفة بسبب والعقم المستعصي للعلاج.
- ٤- حالات فشل إخصاب البو彘ات في تقنية اطفال الانابيب.
- ٥- وجود اعداد قليلة من البو彘ات.



د. عمرو عبد الرزاق

يتم اللجوء الى تقنية الحقن المجهري في حالة عدم حدوث حمل طبيعي خلال عامين من الزواج او خلال سنة واحدة للسيدات فوق ٣٥ سنة، ويفضل استشارة الطبيب بعد ٦ شهور من الزواج في حالة ان يكون عمر السيدة قد تجاوز ٤٠ عاماً. صرخ بذلك الدكتور عمرو عبد الرزاق استشاري امراض النساء والتوليد والحقن المجهري بدار الطب وأضاف انه يمكن ايضا البدء بالحقن المجهري قور اكتشاف احد الحالات التالية:

- ١- الضعف الشديد في عدد

- ٢- الححالات التي لا يوجد فيها حيوانات منوية بالسائل المنوى او حركة أو نسبة التشوهات في الحيوانات المنوية للزوج.