

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Dostour
DATE:	21-May-2016
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	230,000
TITLE :	Aspirin reduces the risk of brain strokes
PAGE:	16
ARTICLE TYPE:	Drug-Related News
REPORTER:	Staff Report

« الأسبرين » يقلل مخاطر السكتات الدماغية



توصل فريق من الباحثين الأوروبيين إلى أن تناول الأسبرين فوراً بعد الإصابة بالسكتات الدماغية يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية الكبرى بين المرضى الذين لديهم تحذيرات من إمكانية عودة وقوعهم فريسة للإصابة بالسكتات الدماغية.

وقال الباحثون في العدد الأخير من دورية «لانسيت» الطبية إن فورية العلاج الذاتي مع الأسبرين عند تجربة المرضى لأعراض السكتة الدماغية من شأنه أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية الكبرى خلال الأيام القليلة التي تعقب الإصابات الثانوية. ويتم بالفعل إعطاء الأسبرين

للأشخاص الذين تعرضوا لسكتة دماغية كبرى أو صغرى عابرة لمنع حدوث المزيد من السكتات الدماغية بعد أن تم تقييمها في المستشفى على المدى الطويل، حيث لوحظ فاعليته لتحد بنسبة ١٥٪ من فرص عودة السكتات الدماغية.