



PRESS CLIPPING SHEET

| PUBLICATION: | Al Wafd |
|---------------|---|
| DATE: | 23-May-2016 |
| COUNTRY: | Egypt |
| CIRCULATION: | 600,000 |
| TITLE: | New drugs to treat complicated stomach tumors that are not responsive to chemotherapy |
| PAGE: | 10 |
| ARTICLE TYPE: | NGO News |
| REPORTER: | Staff Report |





PRESS CLIPPING SHEET

المؤتمر الدولم الخامس لأورام الجهاز الهضمه والمسالك البولية يعلن:

دواء جديد لعلاج أورام المعدة غير المستجيبة للكيماوي

طرح علاج جديد لأورام المعدة بعد مرور ١٥ عاماً يشكل أملاً جديداً للمرضى، وأدوية موجهة ومناعية لعلاج أورام الكلى والبروستاتا بديلاً للعلاج الكيميائي، واستخدام الأشعة التداخلية والعلاجات الإشعاعية فاثقة الدقة وانتهاج أسلوب جديد لسرعة تسجيل أدوية الأورام بالتزامن مع دول المنشأ من قبل وزارة الصحة، كانت تلك أهم ما أعلن عنه المؤتمر الصحفى الذي عقد على هامش المؤتمر الدولي الخامس لأورام الجهاز الهضمى والمسالك البولية، الذى تنظمه جمعية أورام الجهاز الهضمى والكبد برئاسة الدكاترة محمود الميتيني، عميد طب عين شمس، وأسامة حتة، أستاذ الأشعة التداخلية، وهشام الغزالي، أستاذ علاج الأورام كلية طب عين شمس، وبحضور ٢٠ خبيراً أجنبياً من مختلف أنحاء العالم، وعلى رأسهم البروفيسور هانز شمول، رئيس الجمعية الأوروبية لأورام الجهاز الهضمى، ورياض سائم، أستاذ الأشعة التداخلية والعلاج بالنظائر والجسيمات المشعة لأورام الكبد بالولايات المتحدة والبروفيسور براين رينيه، أستاذ علاج الأورام والمسالك البولية بكليفلاند بالولايات المتحدة.

أوضح الدكتور هشام الغزالي، أستاذ علاج الأورام بطب عين شمس، أن أهم ما الطقرات التي حدثت في علاج أورام الجهاز الطقرات التي حدثت في علاج أورام الجهاز الهضمي، خصوصاً أورام الجهاز الهضمي المنتقر، لافتاً إلى أن علاج المرضى أصبح يتم بناؤه على تحديد التشخيص الجيني لكل مريض مع اكتشاف مستقبلات جديدة داخل أنسجته، ما أدى إلى ظهور علاجات حديثة ساعدت على زيادة نسب شفاء أورام الجهاز الهضمي من المرحلة الرابعة إلى أكثر من

وأشار الدكتور هشام الغزالي إلى أن المؤتمر يقدم ١٤٠ ورقة علمية، و٥ ورش عمل لتدريب شباب الأطباء على العلاج الإشعاعي متناهي الدقة وجراحة استخدام الإنسان الآلي لجراحات أورام المسالك الهولية، واستخدام الأشعة التداخلية في



المؤتمر ناقش الجديد في علاج أورام الجهاز الهضمي

علاج أورام الكبد وأورام الجهاز الهضمي المنتشر،

ريتم وضع البروتوكولات والتوصيات الخاصة باستخدام عدد من الأدوية الجديدة لعلاج الأورام أولاً لتحديد توقيت استخدامها، وتتابعها ويتم نشير هدنه التوصيات والبروتوكولات لاستخدامها عالمياً، كما المستقبم السفلية والقريبة من فتجة الشرج عند إحراز استجابة كاملة للعلاج الإشعاعي، ما سيمثل تغييراً أنا يجب الحرص حتى يتأكد هذه الأناوع من الأمراض، إلا أنه يجب الحرص حتى يتم تأكيد هذه الناتاج بدراسات أخرى مشابهة كما يعلن المؤتمر عن مضاعفة فرص

كما يعلن المؤتمر عن مضاعفة فرص الشفاء في أورام البروستاتا المنتشرة والحساسة للملاج الهرموني عند إضافة العلاج الكيميائي منذ البداية، خصوصاً في المرضى الأصغر سنأ الذين يعانون انتشاراً شديداً للورم يصل إلى حوالي ٨٠٪، وقد ظهرت النتائج الأولية في الولايات المتحدة

منذ عامین وتم تأکیدها بدراسات آخری ودراسات استقصائیة حدیثة،

وتحدث الدكتور ياسر عبدالقادر، أستاذ علاج الأورام كلية طب قصر العينى عن ظهور عقار جديد لعلاج أورام المعدة المتقدمة لدى البالغين بعد مرور ١٥ عاماً تقريباً دون أدوية فمالة، مشيراً إلى أن العلاج الجديد يعتمد على وقف نشاط تكوين الأوعية الدموية التي تغذى أنسجة الأورام وليس كعلاج كيماوى.

ويستخدم العقار الجديد، أيضاً، لعلاج المرضى البالغين المصابين بسرطان القولون والمستقيم المنتشر مع تطور المرض كخط دفاع ثان بعد فشل علاج الكيماوى، بالإضافة إلى استخدامه في سرطان الرئة في مراحله المتقدمة بعد فشل العلاج الكيمياوي.

وتحدث الدكتور أسامة حتة، استاذ الأشعة التداخلية طب عين شمس عن الجسيمات الدقيقة المشعة الموجهة بالقسطرة لعلاج أورام الكبد السرطانية المتشعبة، مشيراً إلى أن ظهورها طفرة في علاج أورام الكبد

المتشعبة التى كان ميؤوس من علاجها بالوسائل الأخرى بالأشعة التداخلية.

ويعتمد على العلاج على حقن ملايين من هذه الجسيمات من خلال قسطرة الكبد الشريانية وهي عبارة عن أنبوية دقيقة قطرها حوالي ٢ مم يتم إدخالها من شريان الفخذ الأيمن وتوجه بالأشعة إلى شريان الكبد ثم إلى داخل الورم حيث يتم توجيه ملايين من هذه الجسيمات التي تستقر محدودة المدى التي ثؤدى إلى تدمير منطقة الورم بالكامل وتحوله إلى نسيج متليف الورم بالكامل وتحوله إلى نسيج متليف المقطعة الحلوونية ثلاثية المراحل للكبد ودلالات الأورام.

وتعتبر هذه ألجسيمات فتحاً جديداً في علاج أورام الكبد بالأشعة التداخلية سواء كانت أوراماً أولية وبعض الأورام الثانوية المنتشرة للكبد من سرطان القولون، حيث يتم علاجها بنفس الطريقة بعد استثصال الأورام الأولية.