

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Watan
DATE:	07-November-2016
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	220,000
TITLE :	International conference offers hope to 35% of diabetes patients at risk of vision loss
PAGE:	07
ARTICLE TYPE:	Agency Generated New
REPORTER:	Staff Report
AVE:	25,160

PRESS CLIPPING SHEET

مؤتمر دولي يمنح الأمل لـ ٣٥٪ من مصابي السكر المعرضين لـ «فقدان البصر»

«شلابية»: «السكر» أزمة صحية كبرى تؤثر على حياة ٨ ملايين مصري



جانب من المؤتمر الطبي في دبي

فحص طبي سنوي على العين لكل المرضى المصابين بالسكري يتم خلاله فحص مضاعفات السكر المحتملة.

وتابع: «يُعتبر المرضى المصابون بمرض السكر لفترة عشر سنوات، أو أكثر، هم الأكثر عرضة للإصابة باعتلال الشبكية السكري، وقد تتطور الحالة لدى أي شخص يعاني من النوع الأول أو الثاني من مرض السكر. وهكذا، تزداد احتمالية الإصابة باعتلال الشبكية السكري كلما ازدادت فترة الإصابة بمرض السكر وقلّ التحكم بمستوى السكر في الدم».

وواصل: «قد لا تظهر في البداية أي أعراض لمرض اعتلال الشبكية السكري، أو ربما توجد فقط مشكلات طفيفة في الرؤية، ولكن كلما تقدمت الحالة تظهر أعراض المرض التي تشمل: الشعور بالألم والضغط في كلتا العينين أو إحداهما وظهور بقع أو خطوط داكنة تطفو عند الرؤية (أجسام عائمة) وحدوث ضبابية وتذبذب بالرؤية وعمى الألوان ووجود مناطق معتمة أو فارغة في الرؤية وفقدان البصر. وعادة ما يصيب اعتلال الشبكية السكري كلتا العينين».



رسالة دبي - طارق صبري:

ولفت «مغازي»، خلال كلمته بالمؤتمر، إلى أنه يتصدر قائمة هذه التحديات مرض اعتلال الشبكية السكري، لذلك من أجل وقف تهديداته بصورة فعالة نحن في حاجة إلى التأكيد على مدى أهمية الحفاظ على مستوى الجلوكوز بالدم بالنسبة للمرضى المصابين بداء السكر».

وأضاف أنه: «يمكن تجنب ٩٥٪ من حالات اعتلال الشبكية السكري عن طريق الكشف والعلاج المبكر، ولكن بما أن أعراض هذا المرض لا تظهر في مراحله الأولى، فمن الضروري إجراء

أعلن مؤتمر إقليمي طبي عُقد في دبي عن أمل جديد لقراءة ثلث المرضى المصابين بداء السكر، والمصابين بمرض اعتلال الشبكية السكري، الذي يُعتبر أحد مضاعفات «السكر»، التي تؤدي لضعف الرؤية، وفقدان البصر، حيث تم اكتشاف علاج جديد يساعد بنسبة كبيرة في علاج فقدان البصر. شارك في المؤتمر، الذي نظمته إحدى شركات الأدوية الكبيرة في الشرق الأوسط، نحو ٤٥٠ خبيراً في أمراض العيون من ١٤ دولة، تبادلوا خلاله الخبرات، وناقشوا علاج أمراض الشبكية الحديثة، واستعرضوا خلاله آخر التطورات العلاجية لمرض اعتلال الشبكية السكري بما يشمل أحدث العلاجات التي تمت الموافقة عليها والتي يتم حقنها مباشرة في عين المريض.

وقدّر المشاركون بالمؤتمر أعداد المصابين بداء اعتلال الشبكية السكري بنحو ٤٢٢ مليون شخص، وقدموا توصياتهم للوقاية من المرض، وتحسين نتائج العلاج، وفي مقدمتها الكشف المبكر وتلقي العلاج في الوقت المناسب.

وقال الدكتور صلاح شلابية، أستاذ الغدد الصماء بطب عين شمس: «يمثل مرض السكر أزمة صحية كبرى تؤثر على حياة حوالي ٨ ملايين مصري، ومن المتوقع أن يصل هذا العدد إلى ١٢ مليون مريض بالسكر بحلول عام ٢٠٣٥».

وأضاف «شلابية»، خلال كلمة له بالمؤتمر: «ومع زيادة انتشار مرض السكر يظهر مرض اعتلال الشبكية السكري وما يصاحبه من مضاعفات، أحد الأسباب الرئيسية المؤدية إلى فقدان البصر الذي يمكن تجنبه بين الفئة العمرية العاملة»، لافتاً إلى أن «كل مريض بالسكر معرض للإصابة باعتلال الشبكية السكري، حيث إن حوالي ٣٥٪ من مرضى السكر لديهم درجة من الإصابة باعتلال الشبكية السكري وتمثل نسبتهم نحو عُشر المعرضين لاحتمالية فقدان البصر».

فيما قال الدكتور محمد مغازي، أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة عين شمس: «إن الخطوات التي نتخذها لعلاج مرض السكر يجب أن تتضمن أيضاً مضاعفاته الصحية الخطيرة التي قد تؤدي في نهاية الأمر إلى تدهور شديد في جودة حياة المرضى».