

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Dostour
DATE:	10-November-2016
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	280,000
TITLE :	International conference reveals: One third of diabetes patients suffer from diabetic retinopathy...and 1 in 10 suffer vision loss
PAGE:	09
ARTICLE TYPE:	Agency Generated New
REPORTER:	Staff Report
AVE:	38,100

مؤتمر دولي يكشف:

ثلث مرضى السكر لديهم إصابة باعتلال الشبكية.. ومرض من كل ١٠ يصاب بفقدان البصر

وظهور بقع أو خطوط داكنة تطفو عند الرؤية، أجسام عائمة، وحدوث ضبابية وتذبذب بالرؤية وعمى الألوان ووجود مناطق معتممة أو فارغة في الرؤية وفقدان البصر. وعادة ما يصيب اعتلال الشبكية السكري كلتا العينين.

وأشار خلال المؤتمر الذي تنظمه شركة باير للأدوية بالشرق الأوسط بشكل سنوي إلى التطورات العلاجية لمرض اعتلال الشبكية السكري بما يشمل أحدث العلاجات التي تمت الموافقة عليها والتي يتم حقنها مباشرة في عين المريض، موضحاً أنه كان الخيار العلاجي الوحيد المتاح في السابق يعتمد على تقنية الليزر لمنع تدهور الحالة مع وجود فرصة ضئيلة جداً لتحسين الفعالية في الرؤية.

وأشار إلى أنه خلال السنوات الماضية ومع تطورات العلاج تم اكتشاف مثبط عامل نمو بطانة الأوعية الدموية الذي يتم حقنه في العين مباشرة وفي عام ٢٠١٤ منحت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية، FDA، عقاراً جديداً تسميه العطرلة العلاجية وأعطته الأولوية في المراجعة لعلاج وذمة البقعة الصفراء المرتبطة بداء السكر لدى المرضى المصابين باعتلال الشبكية.

وأضاف أ.د. محمد مغازي، «عقار أفليبريست لديه القدرة على تحسين حدة البصر لدى المرضى المصابين بذمة البقعة الصفراء المرتبطة بداء السكر، في حين تقوم العلاجات الأخرى بسد عامل النمو البطاني الوعائي (VEGF-A)، يثبط عقار أفليبريست جميع بروتينات عامل (VEGF-A)، بالإضافة إلى هرمون النمو المشيمي (PIGF)».

وأوضح أن «مصر انضمت مؤخراً إلى الثلاثين دولة التي وافقت على العقار بعدما صرححت باستخدامه وحصوله على موافقة كل من وكالة الأدوية الأوروبية في يونيو ٢٠١٤ وهيئة الأغذية والأدوية الأمريكية في يوليو ٢٠١٤».



جانب من المؤتمر الدولي لمرض السكر

٩٥٪ من حالات العمى الناتجة عن اعتلال الشبكية نتيجة السكر يمكن تجنبها

للمرضى المصابين بداء السكر، وأردف: «يمكن تجنب ٩٥٪ من حالات اعتلال الشبكية السكري عن طريق الكشف والعلاج المبكر، ولكن بما أن أعراض هذا المرض لا تظهر في مراحله الأولى لذا من الضروري إجراء فحص طبي سنوي على العين لكل المرضى المصابين بالسكري يتم خلاله فحص مضاعفات السكري المحتملة».

وأوضح مغازي، خلال مؤتمر باير، أنه «قد لا تظهر في البداية أي أعراض لمرض اعتلال الشبكية السكري أو ربما توجد فقط مشكلات طفيفة في الرؤية، ولكن كلما تقدمت الحالة تظهر أعراض المرض والتي تشمل: الشعور بالألم والضغط في كلتا العينين أو إحدهما

الأكثر عرضة للإصابة باعتلال الشبكية السكري، وقد تتطور الحالة لدى أي شخص يعاني من النوع الأول أو الثاني من مرض السكر، كما تزداد احتمالية الإصابة باعتلال الشبكية السكري كلما ازدادت فترة الإصابة بمرض السكر وقل التحكم بمستوى السكر في الدم».

أكد مغازي إن الخطوات التي تتخذ لعلاج مرض السكر يجب أن تتضمن أيضاً مضاعفاته الصحية الخطيرة والتي قد تؤدي في نهاية الأمر إلى تدهور شديد في جودة حياة المرضى، لافتاً إلى أن «قائمة هذه التحديات تصددها مرض اعتلال الشبكية السكري، لذلك تأتي أهمية الحفاظ على مستوى الجلوكوز بالدم بالنسبة

السكر لديهم درجة من الإصابة باعتلال الشبكية السكري وتمثل نسبة ١٠ إلى ١٠ احتمالية تعرض المرضى المصابين بفقدان البصر».

وأكد شلباية أن «السكر المضبوط لا يعني عدم زيارة طبيب عيون متخصص لتجنب المضاعفات، خاصة أن اعتلال الشبكية نتيجة مرض السكر هو أحد مضاعفات داء السكري الأكثر انتشاراً الذي يسبب تلف الشبكية، مما قد يؤدي إلى ضعف البصر أو التسبب في فقدانه تماماً».

من جانبه، قال الدكتور محمد مغازي- أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة عين شمس- إن «المرضى المصابين بمرض السكرى لفترة عشر سنوات أو أكثر هم

أكد أطباء أن مرض السكر بمثابة كارثة لا تلتفت الدولة إليها، ويمثل أزمة صحية كبيرة في ظل ارتفاع أعداد المصابين به في مصر والمتوقع وصول عددهم إلى ١٥ مليون مواطن عام ٢٠٣٥، مشيرين إلى مدى تأثيره الكبير من خلال ظهور مرض اعتلال الشبكية السكري وما يصاحبه من مضاعفات قد تصل إلى الإصابة بالعمى.

أوضح الأطباء أن اعتلال الشبكية أحد مضاعفات السكر، والذي يسبب تلف الشبكية، مما قد يؤدي إلى ضعف البصر أو التسبب في فقدانه تماماً. وبمرور الوقت، يتعرض المصابون باعتلال الشبكية نتيجة داء السكري للمخاطر تهدد بصرتهم، ويشغل ذلك ارتشاح مركز الإبصار، وهي عبارة عن ورم يملأ العين «جزء في الشبكية مسئول عن الرؤية المركزية»، وإمكانية تقدم المرض ليصبح اعتلال شبكية نتيجة داء سكري متشعب، مما يؤدي عادة إلى فقدان البصر تماماً نتيجة المضاعفات.

قال الدكتور صلاح شلباية- أستاذ الغدد الصماء بطب عين شمس- إن مرض السكر يمثل أزمة صحية كبيرة تؤثر في حياة ٤٢٢ مليون شخص حول العالم، وحوالي ٨ ملايين مصري، ومن المتوقع أن يصل هذا العدد إلى ١٢ مليون مريض بالسكر بحلول عام ٢٠٣٥.

وأضاف شلباية، خلال المؤتمر الذي عقدته شركة «باير» في دبي، وعلى مدار يومين بعنوان «فوكس FOCUS»، وشارك فيه حوالي ٤٥٠ خبيراً في أمراض العيون من ١٤ دولة، أنه مع زيادة انتشار السكري يظهر مرض اعتلال الشبكية السكري وما يصاحبه من مضاعفات، أحد الأسباب الرئيسية المؤدية إلى فقدان البصر الذي يمكن تجنبه بين الفئة العمرية العاملة.

وأشار إلى أن «كل مريض بالسكر معرض للإصابة باعتلال الشبكية السكري، وإن حوالي ٣٥٪ من مرضى