


## PRESS CLIPPING SHEET

|                      |                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>PUBLICATION:</b>  | Al Gornal Al Eqtisadi                                               |
| <b>DATE:</b>         | 15-July-2019                                                        |
| <b>COUNTRY:</b>      | Egypt                                                               |
| <b>CIRCULATION:</b>  | 5,000                                                               |
| <b>TITLE :</b>       | Novartis: Unprecedented results for advanced breast cancer patients |
| <b>PAGE:</b>         | 11                                                                  |
| <b>ARTICLE TYPE:</b> | Agency-Generated News                                               |
| <b>REPORTER:</b>     | Staff Report                                                        |
| <b>AVE:</b>          | 2,000                                                               |

**PRESS CLIPPING SHEET**

**خلال مؤتمر الجمعية الأمريكية لعلاج الأورام ASCO 2019**

# «نوفارتس»: نتائج فيرمسبيكة لمرضى سرطان الثدي



أعلنت شركة نوفارتس فارما العالمية خلال المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية لعلم الأورام المبريري (ASCO 2019) عن نتائج دراسة إكلينيكية هامة بخصوص إجمالي فترة البقاء على قيد الحياة بعد العلاج بعقار «ريبوسيكليب» بجانب العلاج الهرموني. وقد أحدثت هذه النتائج الواعدة بريقاً من الأمل لدى مريضات سرطان الثدي المتقدم وأمدتهن بشريان جديد لحياة أطول.

وقال دكتور محسن مختار أستاذ علاج الأورام بالقصر العيني: «لأقت النتائج التي أعلنتها نوفارتس اهتماماً إعلامياً كبيراً على الصعيد العالمي، الأمر الذي يمثل شهادة واضحة على أهميتها».

وتكشف الدراسة، التي ضمت أكثر من ٦٠٠ حالة مصابة بسرطان الثدي المتقدم قبل انقطاع الطمث يبلغن من العمر أقل من ٥٩ عاماً، أن المريضات اللاتي حصلن على العلاج المشترك باستخدام العلاج الهرموني وحبّة العقار اليومية «ريبوسيكليب» تحسّن لديهن إجمالي معدل البقاء على قيد الحياة بالنسبة لمرضى سرطان الثدي المنتشر، مقارنة بالسيدات اللاتي حصلن على العلاج الهرموني فقط. ويعمل العلاج المشترك على الحد من نمو خلايا السرطان وإبطاء تقدم المرض ولكنه لا يؤدي إلى الشفاء التام بل يمنح الأمل في حياة أطول».

وأوضح دكتور محسن مختار أن «إجمالي معدل البقاء على قيد الحياة هو طول الفترة الزمنية التي يعيشها المرضى بعد تشخيصهم لأول مرة أو بعد بدء العلاج. ويعد المقياس الأفضل لمدى نجاح العلاج، فهو أحد الطرق التي يحدد من خلالها العلماء مدى فاعلية عقار أو البروتوكول العلاجي الجديد عند اختباره في التجارب الإكلينيكية».

ويعد سرطان الثدي المتقدم الذي يصيب السيدات قبل انقطاع الطمث مرضاً مستعصياً وهو السبب الرئيسي للوفاة بسبب السرطان بين السيدات في الفئة العمرية ٢٠-٥٩ عاماً. وفي مصر، يتم تشخيص ٥٠٪ من حالات سرطان الثدي في السيدات قبل انقطاع الطمث، حيث يبلغ متوسط عمر السيدات اللاتي يتم تشخيصهن بسرطان الثدي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ٤٨ عاماً، أي أقل بعشر سنوات تقريباً من متوسط عمر السيدات المصابات بهذا المرض في الدول الغربية.

وصرح الدكتور شريف أمين، رئيس نوفارتس لأدوية الأورام (مصر- ليبيا- تونس- المغرب):

«قررت نوفارتس العمل وفق تصور جديد لعلاج السرطان يركز على المرضى الذين عانوا من التجاهل في السابق». وأضاف: «كانت السيدات مريضات سرطان الثدي قبل انقطاع الطمث مجموعة فرعية لا تحظى بالاهتمام الملائم في أبحاث سرطان الثدي المتقدم، ولكن في إطار التزامنا تجاه مرضانا، نسعى إلى استعادة التوازن ورأب هذا الصدع من خلال تطوير عقار ريبوسيكليب».

و من جانبه قال الأستاذ الدكتور حمدي عبد العظيم، أستاذ علاج الأورام بالقصر العيني: «أثبتت دراسة (موناليزا-٧) أن عقار «ريبوسيكليب» هو العقار الأول في فئة مثبطات CDK ٦/٤ الذي نجح