

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Akhbar Al Massai (2)
DATE:	09-July-2019
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	49,000
TITLE :	Unprecedented results for Ribociclib in treating advanced breast cancer
PAGE:	03
ARTICLE TYPE:	Agency-Generated News
REPORTER:	Dalia Ameen
AVE:	7,750

PRESS CLIPPING SHEET

خلال مؤتمر الجمعية الأمريكية لعلاج الأورام نجاح «ريبوسيكليب» يحقق طفرة غير مسبوقة في علاج سرطان الثدي المتقدم



أعلنت شركة نوفارتس فارما العالمية عن نجاح عقار «ريبوسيكليب» في علاج سرطان الثدي المتقدم الذي يصيب السيدات في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث، والذي يعد مرضاً مستعصياً، وهو السبب الرئيسي للوفاة بين السيدات في الفئة العمرية من ٥٩:٢٠ عاماً، وذلك بعد إجراء دراسة إكلينيكية مهمة، حيث كشفت نتائج الدراسة التي أجريت على ٦٠٠ مريضة أنه وصل معدل البقاء إلى ٧٠,٢٪ مقارنة بـ ٤٦٪ في حالة العلاج الهرموني بمفرده، وذلك بعد المتابعة لمدة ٤٢ شهراً، حيث إن العلاج المشترك يعمل على الحد من نمو خلايا السرطان وإبطاء تقدم المرض. صرح بذلك الدكتور محسن مختار، أستاذ علاج الأورام بقصر العيني وأضاف أن هذه النتائج التي أعلنتها نوفارتس لاقت اهتماماً إعلامياً كبيراً على الصعيد العالمي. جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية لعلم الأورام بحضور أكثر من ٣٥,٠٠٠ طبيب ومتخصص في علاج الأورام. كما أوضح الدكتور محسن أن (دراسة موناليزا-٧) استهدفت تقييم العلاج بـ «ريبوسيكليب» بجانب العلاج الهرموني (جوزيريلين بجانب مثبط أروماتاز أو تاموكسيفين) كعلاج أولي مقارنة بالعلاج الهرموني وحده، وقد نشرت مجلة نيوانجلاند جورنال أوف

باستمرار من عدم توافر بروتوكول علاجي يستهدف بشكل محدد وفعال نوع السرطان الذي تم تشخيصه به، لكن هذا العلاج المتقدم سيساعد على استعادة المسار الطبيعي لحياتهن. وأوضحت الدكتورة ابشام سعد الدين أستاذ علاج الأورام بقصر العيني أن هناك أربعة أنواع من سرطان الثدي، كل منها له بروتوكول علاجي خاص، مشيرة إلى أن أفضل معدلات الشفاء دائماً ما تكون مصاحبة للعلاجات الأكثر تطوراً، ويعد «ريبوسيكليب» الآن عقاراً معتمداً للاستخدام في ٧٥ دولة على مستوى العالم، بما يشمل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.

مديسين نتائج هذه الدراسة. وأضاف الدكتور شريف أمين، رئيس نوفارتس لأدوية الأورام (مصر- ليبيا- تونس- المغرب) أن السيدات مريضات سرطان الثدي قبل انقطاع الطمث كانت مجموعة فرعية لا تحظى بالاهتمام الملائم في أبحاث سرطان الثدي المتقدم، ولكن في إطار التزامن تجاه مرضانا، تسعى إلى استعادة التوازن ورأب هذا الصدع من خلال تطوير عقار ريبوسيكليب. وأوضح الدكتور هشام الغزالي، أستاذ الأورام بكلية الطب جامعة عين شمس ورئيس الجمعية الدولية للأورام أن سرطان الثدي قبل انقطاع الطمث يصيب السيدات في فترة مقتبل العمر وهي المرحلة الأكثر إنتاجاً في حياتهن، عندما تكون عائلاتهن في أمس الحاجة إليهن، ولكنهن قد عانين

داليا أمين