

## PRESS CLIPPING SHEET

<b>PUBLICATION:</b>	Al Mostasmer
<b>DATE:</b>	July-2019
<b>COUNTRY:</b>	Egypt
<b>CIRCULATION:</b>	35,000
<b>TITLE :</b>	Novartis announces unprecedented results for treating advanced breast cancer
<b>PAGE:</b>	34
<b>ARTICLE TYPE:</b>	Agency-Generated News
<b>REPORTER:</b>	Ayman Mahmoud
<b>AVE:</b>	20,000

**PRESS CLIPPING SHEET**



## في حضور أكثر من 35.000 طبيب ومتخصص في علاج الاورام نوفارتس تكشف الستار عن نتائج غير مسبوقه لمرضى سرطان الثدي المتقدم

في الفئة العمرية ٢٠- ٥٩ عاماً. وفي مصر، يتم تشخيص ٥٠٪ من حالات سرطان الثدي في السيدات قبل انقطاع الطمث، حيث يبلغ متوسط عمر السيدات اللاتي يتم تشخيصهن بسرطان الثدي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ٤٨ عاماً، أي أقل بعشر سنوات تقريباً من متوسط عمر السيدات المصابات بهذا المرض في الدول الغربية.

وصرح الدكتور شريف أمين، رئيس نوفارتس لأدوية الأورام (مصر- ليبيا- تونس- المغرب): "قررت نوفارتس العمل وفق تصور جديد لعلاج السرطان يركز على المرضى الذين عانوا من التجاهل في السابق". وأضاف: "كانت السيدات مريضات سرطان الثدي قبل انقطاع الطمث مجموعة فرعية لا تحظى بالاهتمام اللائق في أبحاث سرطان الثدي المتقدم، ولكن في إطار التزامنا تجاه مرضانا، نسعى إلى استعادة التوازن ورأب هذا الصدع من خلال تطوير عقار زيبوسيكليب".

واستطرد دكتور شريف أمين: "نتائج التجربة الإكلينيكية التي نشاركها معكم اليوم واعدة جداً. فمن اليوم، أصبح عقار "زيبوسيكليب" مثبط CDK٤/٦ الأول والوحيد الذي حقق نتائج إحصائية مميزة فيما يتعلق بإجمالي فترة البقاء على قيد الحياة عند استخدامه مع العلاج الهرموني".

البقاء على قيد الحياة بالنسبة لمرضى سرطان الثدي المنتشر، مقارنةً بالسيدات اللاتي حصلن على العلاج الهرموني فقط، ويعمل العلاج المشترك على الحد من نمو خلايا السرطان وإبطاء تقدم المرض ولكنه لا يؤدي إلى الشفاء التام بل يمنح الأمل في حياة أطول".

كما أوضح دكتور محسن مختار أن "إجمالي معدل البقاء على قيد الحياة هو طول الفترة الزمنية التي يعيشها المرضى بعد تشخيصهم لأول مرة أو بعد بدء العلاج. ويعد المقياس الأفضل لدى نجاح العلاج، فهو أحد الطرق التي يحدد من خلالها العلماء مدى فاعلية عقار أو البروتوكول العلاجي الجديد عند اختبارها في التجارب الإكلينيكية". "وكانت دراسة (موناليزا-٧) (قد استهدفت بالمرحلة الثالثة تقييم العلاج بعقار "زيبوسيكليب" بجانب العلاج الهرموني (جوزيريلين بجانب مثبط أروماتاز أو تاموكسيفين) كعلاج أولي مقارنةً بالعلاج الهرموني وحده لدى المريضات في مرحلة ما قبل أو قرب انقطاع الطمث بسرطان الثدي المتقدم أو المنتشر الإيجابي لمستقبل الهرمون، والسليبي لمستقبل-٢ (HER٢+/HR-)". وقد نشرت مجلة نيون إنغلاند جورنال أوف ميديسين (NEJM) نتائج هذه الدراسة".

ويعد سرطان الثدي المتقدم الذي يصيب السيدات قبل انقطاع الطمث مرضاً مستعصياً وهو السبب الرئيسي للوفاة بسبب السرطان بين السيدات

### كتب- ايمن محمود

أعلنت شركة نوفارتس فارما العالمية خلال المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريري (ASCO ٢٠١٩) عن نتائج دراسة إكلينيكية خاصة بخصوص إجمالي فترة البقاء على قيد الحياة بعد العلاج بعقار "زيبوسيكليب" بجانب العلاج الهرموني، وقد أحدثت هذه النتائج الواعدة بريقاً من الأمل لدى مريضات سرطان الثدي المتقدم وأمدتهن بشريان جديد لحياة أطول.



قال دكتور محسن مختار، أستاذ علاج الأورام بالقصر العيني: "لأقمت النتائج التي أعلنتها نوفارتس اهتماماً كبيراً على الصعيد العالمي، الأمر الذي يمثل شهادة واضحة على أهميتها". وتكشف الدراسة، التي ضمت أكثر من ٦٠٠ حالة مصابة بسرطان الثدي المتقدم قبل انقطاع الطمث يبلغن من العمر أقل من ٥٩ عاماً، أن المريضات اللاتي حصلن على العلاج المشترك باستخدام العلاج الهرموني وحبة العقار اليومية "زيبوسيكليب" تحسن لديهن إجمالي معدل