

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Akhbar (2)
DATE:	01-July-019
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	750,000
TITLE :	New drug boosts breast cancer survival rates
PAGE:	Back Page
ARTICLE TYPE:	Agency-Generated News
REPORTER:	Staff Report
AVE:	29,400

عقار يرفع نسب النجاة من سرطان الثدي

في الفئة العمرية ٢٠ - ٥٩ عاما. وفي مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يتم تشخيص ٥٠٪ من حالات سرطان الثدي في سن ٤٨ عاما، أي أقل بعشر سنوات تقريبا من متوسط عمر السيدات المصابات بهذا المرض في الدول الغربية. ويؤكد د. شريف أمين أن أبحاث سرطان الثدي المتقدم بدأت تولى اهتماما ملحوظا. انقطاع الطمث، وتحققت فيها بالفعل إنجازات طبية كبيرة.



■ جانب من المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريري

أكدت أحدث الدراسات الإكلينيكية نجاح عقار جديد في تحسين فرص الشفاء من مرض سرطان الثدي المتقدم بنسبة لا تقل عن ٧٠٪، حيث كشفت الدراسة أن الاستخدام المشترك للعقار الجديد - واسمه العلمي «ريبوسيكليب» - بجانب العلاج الهرموني، أدى إلى زيادة فترة البقاء على قيد الحياة لمريضات سرطان الثدي المتقدم. جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريري (ASCO ٢٠١٩). وأكد دكتور محسن مختار، أستاذ علاج الأورام بقصر العيني أن العلاج المشترك يعمل على الحد من نمو خلايا السرطان وإبطاء تقدم المرض بالنسبة لمريضات سرطان الثدي المنتشر قبل انقطاع الطمث، مما أدى إلى تحسين معدل بقائهن على قيد الحياة، مقارنة بالسيدات اللاتي حصلن على العلاج الهرموني فقط. ويقول د. هشام الغزالي، أستاذ الأورام بكلية الطب جامعة عين شمس، إن سرطان الثدي المتقدم الذي يصيب السيدات قبل انقطاع الطمث يعد مرضا مستعصيا والسبب الرئيسي لوفاة السيدات مريضات السرطان