

## PRESS CLIPPING SHEET

<b>PUBLICATION:</b>	<b>Al Akhbar Al Massai</b>
<b>DATE:</b>	<b>29-June-2019</b>
<b>COUNTRY:</b>	<b>Egypt</b>
<b>CIRCULATION:</b>	<b>49,000</b>
<b>TITLE :</b>	<b>Novartis unveils unprecedented results for advanced breast cancer patients</b>
<b>PAGE:</b>	<b>06</b>
<b>ARTICLE TYPE:</b>	<b>Agency-Generated News</b>
<b>REPORTER:</b>	<b>Staff Report</b>
<b>AVE:</b>	<b>15,480</b>

# «نوفارتس» تكشف الستار عن نتائج غير مسبوقة لمرضى سرطان الثدي المتقدم

يركز على المرضى الذين عانوا من التجاهل في السابق. وأضاف: «كانت السيدات مريضات سرطان الثدي قبل انقطاع الطمث مجموعة فرعية لا تحظى بالاهتمام الملائم في أبحاث سرطان الثدي المتقدم، ولكن في إطار التزامنا تجاه مرضانا، نسعى إلى استعادة التوازن ورأب هذا الصدع من خلال تطوير عقار ريبوسيكليب». واستطرد الدكتور شريف أمين: «نتائج التجربة الإكلينيكية التي نشاركها معكم اليوم واعدة جداً فمن اليوم، أصبح عقار «ريبوسيكليب» مثبط ٤/CDK الأول والوحيد الذي حقق نتائج احصائية مميزة فيما يتعلق بإجمالي فترة البقاء على قيد الحياة عند استخدامه مع العلاج الهرموني».

ويعد سرطان الثدي المتقدم الذي يصيب السيدات قبل انقطاع الطمث مرضاً مستعصياً وهو السبب الرئيسي للوفاة بسبب السرطان بين السيدات في الفئة العمرية ٢٠-٥٩ عاماً. وفي مصر، يتم تشخيص ٥٠٪ من حالات سرطان الثدي في السيدات قبل انقطاع الطمث، حيث يبلغ متوسط عمر السيدات اللاتي يتم تشخيصهن بسرطان الثدي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ٤٨ عاماً، أي أقل بعشر سنوات تقريباً من متوسط عمر السيدات المصابات بهذا المرض في الدول الغربية. وصرح الدكتور شريف أمين، رئيس نوفارتس لأدوية الأورام (مصر- ليبيا- تونس- المغرب): «قررت نوفارتس العمل وفق تصور جديد لعلاج السرطان

العلاج وبعد المقياس الأفضل لدى نجاح العلاج، فهو أحد الطرق التي يحدد من خلالها العلماء مدى فاعلية عقار أو البروتوكول العلاجي الجديد عند اختبارها في التجارب الإكلينيكية». وكانت دراسة (موناليزا-٧) قد استهدفت بالمرحلة الثالثة تقييم العلاج بعقار «ريبوسيكليب» بجانب العلاج الهرموني (جوزيريدين بجانب مشط أروماناز أو تاموكسيفين) كعلاج أولي مقارنة بالعلاج الهرموني وحده لدى المريضات في مرحلة ما قبل أو قرب انقطاع الطمث بسرطان الثدي المتقدم أو المنتشر الإيجابي لمستقبل الهرمون، والسلبى لمستقبل ٢- (HER2/HR). وقد نشرت مجلة نيو إنجلاند جورنال أوف ميديسين (NEJM) نتائج هذه الدراسة».

الثدي المتقدم قبل انقطاع الطمث يبلغن من العمر أقل من ٥٩ عاماً، أن المريضات اللاتي حصلن على العلاج المشترك باستخدام العلاج الهرموني وجبة العقار اليومية «ريبوسيكليب» تحسن لديهن إجمالي معدل البقاء على قيد الحياة بالنسبة لمرضى سرطان الثدي المنتشر، مقارنة بالسيدات اللاتي حصلن على العلاج الهرموني فقط. ويعمل العلاج المشترك على الحد من نمو خلايا السرطان وإبطاء تقدم المرض ولكنه لا يؤدي إلى الشفاء التام بل يمنح الأمل في حياة أطول». كما أوضح الدكتور محسن مختار أن «إجمالي معدل البقاء على قيد الحياة هو طول الفترة الزمنية التي يعيشها المرضى بعد تشخيصهم لأول مرة أو بعد بدء

أعلنت شركة نوفارتس فارما العالمية خلال المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريري (ASCO ٢٠١٩) عن نتائج دراسة إكلينيكية مهمة بخصوص إجمالي فترة البقاء على قيد الحياة بعد العلاج بعقار «ريبوسيكليب» بجانب العلاج الهرموني وقد أحدثت هذه النتائج الواعدة بريقاً من الأمل لدى مريضات سرطان الثدي المتقدم وأمدتهن بشريان جديد لحياة أطول. قال الدكتور محسن مختار، أستاذ علاج الأورام بالقصر العيني: «النتائج التي أعلنتها نوفارتس اهتماماً كبيراً على الصعيد العالمي، الأمر الذي يمثل شهادة واضحة على أهميتها». وتكشف الدراسة، التي ضمت أكثر من ٦٠٠ حالة مصابة بسرطان