

## PRESS CLIPPING SHEET

<b>PUBLICATION:</b>	Al Gomhoureya
<b>DATE:</b>	06-July-2019
<b>COUNTRY:</b>	Egypt
<b>CIRCULATION:</b>	200,000
<b>TITLE :</b>	Novartis unveils unprecedented results of Ribociclib for treating advanced breast cancer in premenopausal patients
<b>PAGE:</b>	02
<b>ARTICLE TYPE:</b>	Agency-Generated News
<b>REPORTER:</b>	Staff Report
<b>AVE:</b>	35,088

**PRESS CLIPPING SHEET**

## خلال أكبر تجمع لأطباء الأورام في العالم

### نوفارتس تكشف الستار عن نتائج غير مسبوقه لعقار «ريبوسيكليب» لعلاج مرضى سرطان الثدي المتقدم في مرحلة ما قبل انقطاع الطمث



**النتائج المذهلة في مؤتمر (ASCO 2019) تكشف أنه بعد متوسط 42 شهرا من المتابعة**

**وصل معدل البقاء إلى 70,2% في السيدات اللاتي حصلن على العلاج المشترك بعقار «ريبوسيكليب»**

الأكثر تطوراً. أضافت: يتم تصنيف سرطان الثدي وفقاً لمستوى مستقبلات الهرمون (مثل مستقبلات الإستروجين والبروجسترون وHER2)، حيث أن 75% من الأورام تكون إيجابية لمستقبل الهرمون ويتم استخدام العلاج الهرموني لإطالة فترة بقاء المرضى على قيد الحياة، سواء في المراحل المبكرة أو المتقدمة من الإصابة بالمرض.

يعد «ريبوسيكليب» الآن عقاراً معتمداً للاستخدام في 75 دولة على مستوى العالم، بما يشمل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي. وقد تم اعتماد عقار «ريبوسيكليب» بالاشتراك مع مثبط أروماتاز لعلاج السيدات قبل أو قرب أو بعد انقطاع الطمث كعلاج أولي أساسه العلاج الهرموني، ويتم وصف استخدامه أيضاً بالاشتراك مع عقار فولفسترات كعلاج خط أول أو ثان للسيدات بعد انقطاع الطمث، طبقاً لقرارات هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية الصادرة في يوليو 2018 وقرار اللجنة الأوروبية الصادر في ديسمبر 2018. ويجري التقدم للجهات التنظيمية من أجل الحصول على موافقات الهيئات الصحية في دول أخرى حول العالم.

حصلن على العلاج المشترك بعقار «ريبوسيكليب»، مقارنة بمعدل 46% للسيدات اللاتي حصلن على العلاج الهرموني فقط.

قال الدكتور هشام الفزالي، أستاذ الأورام بكلية الطب جامعة عين شمس، ومدير مركز أبحاث طب عين شمس، ورئيس الجمعية الدولية للأورام، وعضو اللجنة العليا للأورام في مصر: «سرطان الثدي قبل انقطاع الطمث يصيب السيدات في فترة مقتبل العمر وهي المرحلة الأكثر إنتاجاً في حياتهن، عندما تكون عائلاتهن في أمس الحاجة إليهن، ولكنهن قد عانين باستمرار من عدم توفر بروتوكول علاجي يستهدف بشكل محدد وفكّال نوع السرطان الذي تم تشخيصهن به، لكن هذا العلاج المتقدم سيساعدهن على استعادة المسار الطبيعي لحياتهن.

أوضحت الدكتورة ابتسام سعد الدين، أستاذة علاج الأورام بالقصر العيني: «هناك أربعة أنواع من سرطان الثدي، كل منها له بروتوكول علاجي خاص، وتجدر الإشارة إلى أن أفضل معدلات الشفاء دائماً ما تكون مصاحبة للعلاجات

أعلنت شركة نوفارتس فارما العالمية خلال المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريري (ASCO 2019) عن نتائج دراسة إكلينيكية هامة بخصوص أجمالي فترة البقاء على قيد الحياة بعد العلاج بعقار «ريبوسيكليب» بجانب العلاج الهرموني. وقد أحدثت هذه النتائج الواعدة بريقاً من الأمل لدى مريضات سرطان الثدي المتقدم وأمدتهن بشريان جديد لحياة أطول.

صرح الدكتور شريف أمين، رئيس نوفارتس لأدوية الأورام (مصر-ليبيا-تونس-المغرب): «قررت نوفارتس العمل وفق تصور جديد لعلاج السرطان يركز على المرضى الذين عانوا من التجاهل في السابق.

أضافه كانت السيدات مريضات سرطان الثدي قبل انقطاع الطمث مجموعة فرعية لا تحظى بالاهتمام اللائق في أبحاث سرطان الثدي المتقدم، ولكن في إطار التزامنا تجاه مرضانا، نسمي إلى استعادة التوازن ورأب هذا الصدع من خلال تطوير عقار «ريبوسيكليب».

أضاف أن «نتائج التجربة الإكلينيكية التي نشاركها معكم اليوم واعدة جداً. فمن اليوم أصبح عقار «ريبوسيكليب» مثبط CDK4/6 الأول والوحيد الذي حقق نتائج إحصائية مميزة فيما يتعلق بإجمالي فترة البقاء على قيد الحياة عند استخدامه مع العلاج الهرموني.

من جانبه قال الأستاذ الدكتور حمدي عبد العظيم، أستاذ علاج الأورام بالقصر العيني: أثبتت دراسة (عونا ليزا 7) أن عقار «ريبوسيكليب» هو العقار الأول في فئة مثبطات CDK4/6 الذي نجح في تحسين إجمالي معدل البقاء على قيد الحياة لمرضى سرطان الثدي المنتشر.

أضافه لقد أكدت النتائج أن «ريبوسيكليب» تمكن من إطالة فترة البقاء على قيد الحياة للسيدات قبل انقطاع الطمث المصابات بسرطان الثدي المتقدم HR+/HER2-. بعد متوسط 42 شهراً من المتابعة، وبلغ معدل البقاء على قيد الحياة 70,2% للسيدات اللاتي