

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Shorouq (Sup)
DATE:	30-June-2019
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	50,000
TITLE :	Novartis announces unprecedented results for advanced breast cancer in premenopausal women
PAGE:	Back Page
ARTICLE TYPE:	Agency-Generated News
REPORTER:	Rady Abdel Bari
AVE:	40,950

«نوفارتس» تكشف الستار عن نتائج غير مسبوقة لمرضى سرطان الثدي المتقدم قبل انقطاع الطمث



جانب من مؤتمر نوفارتس

كتب - راضى عبد البارى:

أعلنت شركة نوفارتس فارما العالمية خلال المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريري (ASCO) ٢٠١٩ عن نتائج دراسة إكلينيكية مهمة بخصوص إجمالي فترة البقاء على قيد الحياة بعد العلاج بعقار «ريبوسيكليب» بجانب العلاج الهرمونى. وقد أحدثت هذه النتائج الواعدة بريقاً من الأمل لدى مريضات سرطان الثدي المتقدم وأمدتهن بشريان جديد لحياة أطول. وقال الدكتور محسن مختار، أستاذ علاج الأورام بقصر العيني: إن النتائج التى أعلنتها نوفارتس لاقت اهتماماً إعلامياً كبيراً على الصعيد العالمى، الأمر الذى يمثل شهادة واضحة على أهميتها.

وأضاف «عندما تقوم أكبر القنوات الإخبارية الدولية، مثل NBCNews و New York Times و Reuters و Forbes، بالبحث المباشر لهذه التقارير بعد ساعات قليلة من إعلانها، فهذا دليل واضح على أن تلك القنوات تعتبر هذه النتائج إحدى التطورات العلمية التى ستلقى تقييداً كبيراً من جمهور المشاهدين.

وتكشف الدراسة، التى ضمت أكثر من ٦٠٠ حالة مصابة بسرطان الثدي المتقدم قبل انقطاع الطمث يبلغن من العمر أقل من ٥٩ عاماً، أن المريضات اللاتى حصلن على العلاج المشترك باستخدام العلاج الهرمونى وحبة العقار اليومية «ريبوسيكليب» تحسّن لديهن إجمالى معدل البقاء على قيد الحياة بالنسبة لمرضى سرطان الثدي المنتشر، مقارنة بالسيدات اللاتى حصلن على العلاج الهرمونى فقط. وأوضح مختار أن إجمالى معدل البقاء على قيد الحياة

فى السيدات قبل انقطاع الطمث، حيث يبلغ متوسط عمر السيدات اللاتى يتم تشخيصهن بسرطان الثدي فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ٤٨ عاماً، أى أقل بعشر سنوات تقريباً من متوسط عمر السيدات المصابات بهذا المرض فى الدول الغربية.

ومن جانبه قال الدكتور شريف أمين، رئيس نوفارتس لأدوية الأورام (مصر- ليبيا - تونس - المغرب): «قررت نوفارتس العمل وفق تصور جديد لعلاج السرطان يركز على المرضى الذين عانوا من التجاهل فى السابق».

وأضاف «كانت السيدات مريضات سرطان الثدي قبل انقطاع الطمث مجموعة فرعية لا تحظى بالاهتمام الملائم فى أبحاث سرطان الثدي المتقدم، ولكن فى إطار التزامنا تجاه مرضانا، نسعى إلى استعادة التوازن ورأب هذا الصدع من خلال تطوير عقار ريبوسيكليب».

هو طول الفترة الزمنية التى يعيشها المرضى بعد تشخيصهم لأول مرة أو بعد بدء العلاج. ويعد المقياس الأفضل لمدى نجاح العلاج، فهو إحدى الطرق التى يحدد من خلالها العلماء مدى فاعلية عقار أو البروتوكول العلاجى الجديد عند اختياره فى التجارب الإكلينيكية.

وكانت دراسة (موناليزا-٧) قد استهدفت بالمرحلة الثالثة تقييم العلاج بعقار «ريبوسيكليب» بجانب العلاج الهرمونى (جوزيريلين بجانب مثبط أروماتاز أو تاموكسيفين) كعلاج أولى مقارنة بالعلاج الهرمونى وحده لدى المريضات فى مرحلة ما قبل أو قرب انقطاع الطمث بسرطان الثدي المتقدم أو المنتشر الإيجابى لمستقبل الهرمون، والسلىبى لمستقبل ٢- (HR+/HER٢-). وقد نشرت مجلة نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين (NEJM) نتائج هذه الدراسة. وفى مصر، يتم تشخيص ٥٠٪ من حالات سرطان الثدي