

## PRESS CLIPPING SHEET

<b>PUBLICATION:</b>	Radio & Television
<b>DATE:</b>	06-July-2019
<b>COUNTRY:</b>	Egypt
<b>CIRCULATION:</b>	20,000
<b>TITLE :</b>	Controlling breast cancer
<b>PAGE:</b>	76
<b>ARTICLE TYPE:</b>	Agency-Generated News
<b>REPORTER:</b>	Staff Report
<b>AVE:</b>	2,500

**علاج**

## السيطرة على سرطان الثدي

خلال المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريري. أعلنت إحدى شركات الأدوية متعددة الجنسيات عن نتائج دراسة أكلينيكية مهمة بخصوص إجمالي فترة البقاء على الحياة بعد العلاج بالعقار الجديد بجانب العلاج الهرموني.

**الدكتور حمدي عبد العظيم، أستاذ علاج الأورام بقصر العيني، قال:** إن دراسة ( الموناليزا 7 ) أثبتت أن هذا العقار هو الأول من فئة مثبطات CSI 6/4 الذي نجح في تحسين إجمالي معدل البقاء على قيد الحياة لمرضى سرطان الثدي المنتشر. وأضاف لقد أكدت النتائج أن هذا الدواء تمكن من إطالة فترة البقاء على قيد الحياة للسيدات قبل انقطاع الطمث المصابات بسرطان الثدي المتقدم بعد متوسط 42 شهرا من المتابعة وبلغ معدل البقاء على قيد الحياة 70,2 للسيدات اللاتي حصلن على العلاج بالعقار مقارنة بمعدل 46 % للسيدات اللاتي حصلن على العلاج الهرموني فقط.

وأضاف الدكتور هشام الغزالي أستاذ الأورام بكلية الطب جامعة عين شمس ورئيس الجمعية الدولية للأورام،



جانب من المؤتمر

وعضو اللجنة العليا للأورام في مصر: إن سرطان الثدي قبل انقطاع الطمث يصيب السيدات في فترة مقتبل العمر وهي المرحلة الأكثر إنتاجا في حياتهن عندما تكون عائلاتهن في أمس الحاجة إليهن، ولكنهن قد عانين باستمرار من عدم توفر بروتوكول علاجي يستهدف بشكل محدود وفعال نوع السرطان المصابات به، ولكن هذا العلاج المتقدم سيساعدهن على استعادة المسار الطبيعي لحياتهن.

**الدكتورة ابتسام سعد الدين، أستاذ علاج الأورام بقصر العيني، قالت:** إن هناك أربعة أنواع من سرطان الثدي كل منها له بروتوكول علاجي خاص، وتعد أفضل معدلات الشفاء دائما ما تكون مصاحبة للعلاجات الأكثر تطورا، وأضافت: يتم تصنيف سرطان الثدي وفقا لمستوى مستقبلات الهرمون مثل الاستروجين، والبروجسترون و her2 حيث إن 75 % من الأورام تكون إيجابية لمستقبل الهرمون ويتم استخدام العلاج الهرموني لإطالة فترة بقاء المرضى على قيد الحياة.. سواء في المراحل المبكرة أو المتقدمة من الإصابة بالمرض.