

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Wafd
DATE:	30-May-2016
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	600,000
TITLE :	Prostatitis symptoms
PAGE:	11
ARTICLE TYPE:	General Health News
REPORTER:	Salah Tawfik

PRESS CLIPPING SHEET

علامات الإصابة بالبروستاتا



د. محمود عزت إبراهيم

ويوضح الدكتور محمود عزت يتم التدخل بالمنظار أو بالعملية الجراحية في حالات محددة فقط إذا فشل العلاج الدوائي أو حدث احتباس بولي متكرر، أما أورام البروستاتا الخبيثة فهي تظهر دائماً بعد سن ٤٥ سنة وقد تكون بلا أعراض وأحياناً تكون بأعراض منها النزيف وضعف اندفاع البول وانتشار الورم بالجسم ويتم التشخيص بوجود ارتفاع بمعدل دلائل أورام البروستاتا في الدم (بي إس إيه) ويعمل عينة بالإبرة وتحليل باثولوجي لها، وعلاجها يتوقف على المرحلة الموجود بها البروستاتا سواء علاجاً جراحياً أو علاجاً إشعاعياً أو علاجاً هرمونياً.

صلاح توفيق

تتعدد أمراض البروستاتا ما بين وجود التهابات وعدوى، إما عدوى حادة أو مزمنة أو وجود احتقان في البروستاتا؛ نتيجة الإثارة الجنسية المستمرة. ويعرف الدكتور محمود عزت إبراهيم، أستاذ الكلى والمسالك البولية البروستاتا بأنها غدة تكون في الرجال فقط، وهي موجودة حول عنق المثانة البولية، وتمر بها قناة مجرى البول لمسافة ٢ سم تقريباً، والتهابات البروستاتا تكون دائماً في فترة النشاط الجنسي للرجال من سن ١٨ إلى ٤٥ سنة تقريباً وغالباً التهابات بكتيرية تسبب آلاماً للرجال أثناء التبول، وزيادة في عدد مرات التبول مع وجود صديد في البول، وفي سائل البروستاتا، ويمكن إجراء فحص مزرعة ومعرفة أنجح المضادات الحيوية تأثيراً فيه، غير أن هناك أنواعاً أخرى خاصة من التهابات البروستاتا، منها الالتهابات غير البكتيرية أي أن هناك التهاباً، ولكن ليس هناك بكتيريا تظهر عند زرع سائل البروستاتا، وهي نوع مبهم، وتتسبب في وجود آلام بالبروستاتا وربما تصل الآلام إلى الخصية، ويوجد نوع آخر من الالتهابات مثل البلهارسيا والدرن وهي التهابات مزمنة تحتاج إلى علاج خاص سواء للبلهارسيا التي قلت كثيراً جداً بعد علاج البلهارسيا والدرن وعلاجه يحتاج إلى علاج الدرّن، ويتم التشخيص من خلال مزارع خاصة، والدرن يحتاج لعلاج لمدة ٦ شهور.

ويرى الدكتور محمود عزت، أن مشاكل غدة البروستاتا في سن ٥٠ سنة فما فوق هي تطور مع السن وتضخم حجم البروستاتا، وهو تضخم حميد يزداد مع تقدم السن، وحجم الغدة الطبيعي حوالي ١٨ إلى ٢٠ جراماً ومع التضخم الشخوي تصل إلى ٥٠ جراماً، وربما إلى أكثر من ١٠٠ جرام، وتتسبب في أعراض اضطراب للبول وصعوبة في التبول وزيادة عدد مرات التبول خصوصاً مساءً وربما احتباس بولي وفي حالة وجود اضطرابات في البول يعطى المريض علاجاً لتحسين عملية التبول.