

## PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Akhbar Al Youm
DATE:	12-November-2016
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	1,300,000
TITLE :	New drug to ameliorate vision loss in 30% of diabetes patients
PAGE:	02
ARTICLE TYPE:	Agency Generated New
REPORTER:	Ahmed Hamdy
AVE:	31,920

# الصحة والجمال

إشراف: د. أحمد عبد السلام

عقدت شركة باير للأدوية في الشرق الأوسط على مدار يومين مؤتمراً إقليمياً كبيراً أقيم في دبي بعنوان فوكاس (FOCUS) وشارك فيه حوالي ٤٥٠ خبيراً في أمراض العيون من ١٤ دولة.

ناقش المشاركون في المؤتمر التطورات العلاجية المتعلقة بمرض اعتلال الشبكية السكري وما يصاحبه من أعراض وذمة البقعة الصفراء المرتبطة ببدء السكري - أحد مضاعفات داء السكري التي قد تؤدي إلى ضعف الرؤية وفقدان البصر وتؤثر على ما يقرب من ثلث المصابين بداء السكري وجه الخصوص.

حول العالم والذي يقدر عددهم بـ ٤٢٢ مليون شخص. كما قدم الحضور توصياتهم للوقاية من المرض وتحسين نتائج العلاج. وفي مقدمتها الكشف المبكر وتلقي العلاج في الوقت المناسب. ويعقد المؤتمر بشكل سنوي يضم نخبة من أطباء العيون المتميزين على المستويين الإقليمي والعالمي لتبادل الخبرات وتوحيد الجهود بهدف مناقشة علاجات أمراض الشبكية عمومًا واعتلال الشبكية السكري على وجه الخصوص.

«فوكاس»... مؤتمر دولي بدبي بمشاركة ٤٥٠ خبيراً في أمراض العيون من ١٤ دولة يكشف عن:

## عقار جديد لتحسين فقدان الرؤية لـ ٣٠٪ من مرضى السكر

### ٧,٥ مليون مصاب في مصر عرضة لاعتلال الشبكية وإعاقة الرؤية

**رسالة رئيسي**



**أحمد حمدي**

يصيب اعتلال الشبكية السكري كلتا العينين. واستعرض المشاركون بالمؤتمر آخر التطورات العلاجية لمرض اعتلال الشبكية السكري بما يشمل أحدث العلاجات التي تمت الموافقة عليها والتي يتم حثها مباشرة في عين المريض. وكان الخيار العلاجي الوحيد المتاح في السابق يعتمد على تقنية الليزر لمنع تدهور الحالة مع وجود فرصة ضئيلة جداً للتحسين الفعلي في الرؤية.

وفي السنوات الماضية ومع مضاعفات السكري المحتملة: يعتبر المرضى المصابون بمرض السكري لمدة عشر سنوات أو أكثر هم الأكثر عرضة للإصابة باعتلال الشبكية السكري. وقد تتطور الحالة لدى أي شخص يعاني من النوع الأول أو الثاني من مرض السكر. وهكذا، تزداد احتمالية الإصابة باعتلال الشبكية السكري كلما ازادت فترة الإصابة بمرض السكر وقل التحكم بمستوى السكر في الدم. "قد لا تظهر في البداية أي أعراض لمرض اعتلال الشبكية السكري أو ربما توجد فقط مشكلات طفيفة في الرؤية. ولكن كلما تقدمت الحالة تظهر أعراض المرض والتي تشمل: الشعور بالألم والضعف في كلتا العينين أو إحداهما وظهور بقع أو خطوط داكنة تغطي عند الرؤية (أجسام عائمة) وحدوث ضبابية وتذبذب بالونية وعمى الألوان ووجود مناطق معتمة أو فارغة في الرؤية وفقدان البصر. وعادة ما



عن طريق الكشف والعلاج المبكر، ولكن بما أن أعراض هذا المرض لا تظهر في مراحله الأولى لذا من الضروري إجراء فحص طبي سنوي على العين لكل المرضى المصابين بالسكري يتم خلاله فحص

الصحة الخلوية والتي قد تؤدي في نهاية الأمر إلى تدهور شديد في صحة المرضى. ويتصدر قائمة هذه التحديات مرض اعتلال الشبكية السكري، لذلك من أجل وقف تهديداته بصورة فعالة نحن في حاجة إلى التأكيد على مدى أهمية الحفاظ على مستوى الجلوكوز بالدم بالنسبة للمرضى المصابين بداء السكري. وأضاف أنه: "يمكن تجنب 95 ٪ من حالات اعتلال الشبكية السكري

خال د. صلاح شليباية، أستاذ الغدد الصماء، يعلب عين شمس أن داء السكري يمثل أزمة صحية كبرى تؤثر على حياة حوالي ثمانية ملايين مصري. ومن المتوقع أن يصل هذا العدد إلى ١2 مليون مريض بالسكر بحلول عام 2035. ومع زيادة انتشار السكري يظهر مرض اعتلال الشبكية السكري وما يصاحبه من مضاعفات هو أحد الأسباب الرئيسية المؤدية إلى فقدان البصر الذي يمكن تجنبه بين الفئات العمرية العاملة". وأضاف "كل مريض بالسكر معرض للإصابة باعتلال الشبكية السكري، حيث إن حوالي 35% من مرضى السكر لديهم درجة من الإصابة باعتلال الشبكية السكري وتعتل نسبة 10-1 احتمالية تعرض المرضى المصابين بفقدان البصر". ومن جانبه قال د. محمد مغازي، أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة عين شمس: "إن الخطوات التي نتخذها لعلاج مرض السكر يجب أن تتضمن أيضاً مضاعفاته

يصيب اعتلال الشبكية السكري كلتا العينين. واستعرض المشاركون بالمؤتمر آخر التطورات العلاجية لمرض اعتلال الشبكية السكري بما يشمل أحدث العلاجات التي تمت الموافقة عليها والتي يتم حثها مباشرة في عين المريض. وكان الخيار العلاجي الوحيد المتاح في السابق يعتمد على تقنية الليزر لمنع تدهور الحالة مع وجود فرصة ضئيلة جداً للتحسين الفعلي في الرؤية.

وفي السنوات الماضية ومع مضاعفات السكري المحتملة: يعتبر المرضى المصابون بمرض السكري لمدة عشر سنوات أو أكثر هم الأكثر عرضة للإصابة باعتلال الشبكية السكري. وقد تتطور الحالة لدى أي شخص يعاني من النوع الأول أو الثاني من مرض السكر. وهكذا، تزداد احتمالية الإصابة باعتلال الشبكية السكري كلما ازادت فترة الإصابة بمرض السكر وقل التحكم بمستوى السكر في الدم. "قد لا تظهر في البداية أي أعراض لمرض اعتلال الشبكية السكري أو ربما توجد فقط مشكلات طفيفة في الرؤية. ولكن كلما تقدمت الحالة تظهر أعراض المرض والتي تشمل: الشعور بالألم والضعف في كلتا العينين أو إحداهما وظهور بقع أو خطوط داكنة تغطي عند الرؤية (أجسام عائمة) وحدوث ضبابية وتذبذب بالونية وعمى الألوان ووجود مناطق معتمة أو فارغة في الرؤية وفقدان البصر. وعادة ما