

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Rose El Youssef
DATE:	14-November-2016
COUNTRY:	Egypt
Title:	FOCUS Medical Conference in Dubai Reveals: Advances in Macular Edema (DME) Treatment
CIRCULATION:	300,000
PAGE:	78
ARTICLE TYPE:	Agency Generated New
REPORTER:	Staff Report
AVE:	7,500

PRESS CLIPPING SHEET

المؤتمر الطبى فوكاس «FOCUS» بدبى يكشف عن: التطورات العلاجية لمرض اعتلال الشبكية السكرى



«باير تواصل مسيرتها وتعزيز جهودها للارتقاء بعلاجات الشبكية وتحسين جودة حياة المرضى
٩٥٪ من حالات العمى الناتجة عن اعتلال الشبكية نتيجة داء السكرى يمكن تجنبها عن طريق الكشف المبكر

عقدت شركة باير للأدوية فى الشرق الأوسط على مدار يومين مؤتمراً إقليمياً فى دبى بعنوان فوكاس «FOCUS» وشارك فيه حوالى ٤٥٠ خبير فى أمراض العيون من ١٤ دولة. وقد ناقش المشاركون فى المؤتمر التطورات العلاجية المتعلقة بمرض اعتلال الشبكية السكرى وما يصاحبه من وذمة البقعة الصفراء المرتبطة بداء السكرى «أحد مضاعفات داء السكرى التى قد تؤدى إلى ضعف الرؤية وفقدان البصر» وتؤثر على ما يقرب من ثلث المصابين بداء السكرى حول العالم والذين يقدر عددهم بـ ٤٢٢ مليون شخص. كما قدم الحضور توصياتهم للوقاية من المرض وتحسين نتائج العلاج، وفى مقدمتها الكشف المبكر وتلقى العلاج فى الوقت المناسب.

وتستضيف شركة باير للأدوية بالشرق الأوسط مؤتمر فوكاس «FOCUS» بشكل سنوى وهو يضم نخبة من أطباء العيون المتميزين على المستويين الإقليمى والعالمى لتبادل الخبرات وتوحيد الجهود بهدف مناقشة علاجات أمراض الشبكية عموماً واعتلال الشبكية السكرى على وجه الخصوص.

وقد صرح أ. د/ صلاح شليباية، أستاذ الغدد الصماء بطب عين شمس: «يمثل داء السكرى أزمة صحية كبرى تؤثر على حياة حوالى ثمانية مليون مريض - ومن المتوقع أن يصل هذا العدد إلى ١٢ مليون مريض بالسكر بحلول عام ٢٠٣٥. ومع زيادة انتشار السكرى يظهر مرض اعتلال الشبكية السكرى وما يصاحبه من مضاعفات، أحد الأسباب الرئيسية المؤدية إلى فقدان البصر الذى يمكن تجنبه بين الفئة العمرية العاملة». وأضاف «كل مريض بالسكر معرض للإصابة باعتلال الشبكية السكرى: حيث إن حوالى ٣٥٪ من مرضى السكر لديهم درجة من الإصابة باعتلال الشبكية السكرى وتمثل نسبة ١٠:١ احتمالية تعرض المرضى المصابين بفقدان البصر».

وقد نوه أ. د/ محمد مغازى، أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة عين شمس: «إن الخطوات التى نتخذها لعلاج مرض السكرى يجب أن تتضمن أيضاً مضاعفاته الصحية الخطيرة والتى قد تؤدى فى نهاية الأمر إلى تدهور شديد فى جودة حياة المرضى. ويتصدر قائمة هذه التحديات مرض اعتلال الشبكية السكرى، لذلك من أجل وقف تهديدهاته بصورة فعالة نحن فى حاجة إلى التأكيد على مدى أهمية الحفاظ على مستوى الجلوكوز بالدم بالنسبة للمرضى المصابين بداء السكرى». وأضاف أنه: «يمكن تجنب ٩٥٪ من حالات اعتلال الشبكية السكرى عن طريق الكشف والعلاج المبكر، ولكن بما أن أعراض هذا المرض لا تظهر فى مراحله الأولى لذا من الضروري إجراء فحص طبي سنوى على العين لكل المرضى المصابين بالسكرى يتم خلاله فحص مضاعفات السكرى المحتملة».

كما أوضح أ. د/ محمد مغازى قائلاً: «يعتبر المرضى المصابين بمرض السكرى لفترة عشر سنوات أو أكثر هم الأكثر عرضة للإصابة باعتلال الشبكية السكرى، وقد تتطور الحالة لدى أى شخص يعاني من النوع الأول أو الثانى من مرض السكر. وهكذا، تزداد احتمالية الإصابة باعتلال الشبكية السكرى كلما ازدادت فترة الإصابة بمرض السكر وقل التحكم بمستوى السكر فى الدم». «قد لا تظهر فى البداية أى أعراض لمرض اعتلال الشبكية السكرى أو ربما توجد فقط مشكلات طفيفة فى الرؤية، ولكن كلما تقدمت الحالة تظهر أعراض المرض والتى تشمل: الشعور بالألم والضغط فى كلاً العينين أو إحدهما وظهور بقع أو خطوط داكنة تطفو عند الرؤية (أجسام عائمة) وحدوث ضبابية وتذبذب بالرؤية وعمى الألوان ووجود مناطق معتمة أو فارغة فى الرؤية وفقدان البصر. وعادة ما يصيب اعتلال الشبكية السكرى كلاً العينين».

وقد استعرض المشاركون بالمؤتمر آخر التطورات العلاجية لمرض اعتلال الشبكية السكرى بما يشمل أحدث العلاجات التى تمت الموافقة عليها والتى يتم حقنها مباشرة فى عين المريض. ■