

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Dyar
DATE:	3-Mai-2016
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	200,000
TITLE :	Good news for patients: MoH approves launch of new heart attack treatment drug
PAGE:	02
ARTICLE TYPE:	Drug-Related News
REPORTER:	Mohamed Kandeel

بشرى سارة للمرضى

الصحة توافق على طرح عقار جديد لعلاج أزمات القلب



أحدث علاجات مرض أزمات القلب
معا من أجل رعاية صحة أفضل للمريض المصري
شراكة شركة AstraZeneca

محمد قنديل

في بشرى جديدة لمرضى القلب والذي يعد السبب الأول للوفاة لدى المصريين وافقت وزارة الصحة على طرح عقار جديد لعلاج التنبؤات القلبية والذبحة الصدرية الغير مستقرة وذلك عن طريق منع تكس الصفائح الدموية.

يتميز العقار الجديد «تيكاجريلور» بمفعوله السريع الذي لا يتعدى ٣٠ دقيقة، مما يساعد في التدخل السريع بعملية القسطرة القلبية لتوسعة الشريان لإتخاذ مرضى الأزمات القلبية خلال الساعة الأولى من وقت الإصابة.

وقد أظهرت دراسة «بليتو» التي شملت ١٨٦٢٤ مريض واستمرت لمدة عام أن المرضى الذين تناولوا العقار الجديد، انخفضت الوفيات لديهم بنسبة ٢٢٪، كما انخفضت نسبة حدوث أزمة قلبية مرة أخرى إلى ١٨٪. كما أثبتت الدراسة أن نسبة انسداد الدعامات المستخدمة لتوسعة الشرايين بعد استخدام العقار الجديد انخفضت بنسبة ٢٣٪ مقارنة بالعقاقير الأخرى مع اختلاف نوع الدعامات ومن بينها الدوائية.

وأوضح د.محمد صبحي، أستاذ أمراض القلب كلية طب جامعة الإسكندرية ورئيس الجمعية المصرية للقلب السابق، أن العقار الجديد يعمل على انزيم يدعى «بي ٢ واي

و١٢ يمنع تكس الصفائح الدموية، ويتميز بمفعوله السريع خلال ٣٠ دقيقة، مقارنة بالأدوية الأخرى التي تبدأ مفعولها بعد ساعتين، لافتا إلى أن المفعول السريع للعقار يساعد في التدخل السريع عند حدوث جلطة أو ذبحة بالقسطرة القلبية للإستفادة من الـ ٩٠ دقيقة الذهبية الأولى من وقت الإصابة بالجلطة، بدلا من الإنتظار ساعتين.

وأضاف د.صبحي أن الدراسات أثبتت أن التدخل لعلاج الجلطات - خاصة جلطات الشرايين التاجية - في الساعات الأولى عن طريق فتح الشريان بالقسطرة أفضل من استخدام العقار المذيب للجلطة، نظرا لأنه بعد فتح الشريان، يتم التعامل مع الضيق إن وجد بتركيب دعامه، ويترتب على ذلك عودة عضلة القلب إلى وضعها الطبيعي، فيما يمثل المريض إلى الشفاء خلال ٣ أو ٥ أيام ويغادر المستشفى للعمل، مضاعفات.

والعقار الجديد يستخدم في الساعات الأولى لإجراء القسطرة. أما استخدام الحقنة المذيبة للجلطة فإنه يصلح في حالة عدم توفر قسطرة نظرا لأنه يفتح الشريان بنسبة ٥٠٪ فقط، ويفضل استخدام مذيب الجلطة إذا كان جهاز القسطرة يبعد عن مكان الإصابة بأكثر من ٩٠ دقيقة. وعن أشهر الأعراض التي تشير إلى الإصابة بالجلطة، الإحساس بالألم في الصدر إذا استمر أكثر من ربع ساعة، وقد يأتي في صورة الشعور بحجر ثقيل على الصدر، أو حرقان، والأفضل هو التعامل مع كل أنواع الآلام بجديّة حتى لو كان خفيف، لأن الجلطة قد لا تؤدي إلى الوفاة، ولكنها قد تتلف جزء من عضلة القلب، ويترتب على ذلك انخفاض معدل الحياة، والمعالجة من مضاعفات الجلطة. والتدخل ميكرًا يجنب الوفاة أو الحياة بدون مضاعفات.