

PRESS CLIPPING SHEET

PUBLICATION:	Al Wafd
DATE:	23-May-2016
COUNTRY:	Egypt
CIRCULATION:	600,000
TITLE :	3 protocols for the treatment of HCV
PAGE:	10
ARTICLE TYPE:	NGO News
REPORTER:	Mostafa Donkol

3 «بروتوكولات» لعلاج فيروس «سى»

بالنسبة لمن يتم علاجهم بالأدوية الجديدة، ويوضح الدكتور محمد عز العرب أن الانتكاسات كانت في البروتوكول الأول للعلاج في مصر، خاصة العلاج الثنائي «السوفالدي مع الريبافيرين» لمدة ستة شهور، وكانت مسار جدل بين أطباء الكبد، وتم تفادي هذا البروتوكول لاحقاً، نظراً لحدوث نسب الانتكاس والمضاعفات الأولية للمرضى ويجب الشريط في علاج فيروس «سى» للمرضى الذين يعانون من سرطان في الكبد حتى لو تم علاجهم من السرطان، وفي تجربة إيطالية - إسبانية وضعت مؤشراً لاحتمالية حدوث انتكاس للأورام سريعة عند العلاج بالأدوية الحديثة ولم يتم التوصية بعدم علاج مرضى السرطان نهائياً بواسطة هذه الأدوية، ولكن كان تحذير في انتظار المزيد من نتائج العلاج لهؤلاء المرضى.

مصطفى دنكل

أما الجمعية الأوروبية للكبد فقد أعلنت في مؤتمر أبريل ٢٠١٦ أن نفس البروتوكول العلاج السابق مع إضافة الهارفوني بالتركيبة الجديدة «السوفالدي وفيلباتاسفير» ١٠٠ ملم بدلاً عن السوفالدي مع اليندياسفير والخيار الثاني الزيباتير.

ويضيف الدكتور محمد عز العرب يلاحظ أن بروتوكولات العلاج المصرية الحالية تتوافق مع البروتوكولات العالمية مع ملاحظة أنه يجب العمل على توفير عقار الزيباتير للسوق المصري والتركيبة الجديدة للهارفوني التي سيتم اعتمادها من قبل هيئة الأغذية والدواء الأمريكية في ٢٨ يونيو القادم، ويتم التقييم الفعلي لهذه الخطوط العلاجية من واقع الاستجابة المستديرة، علماً بأنه تم علاج عدد من المرضى يتجاوز ٢٥٠ ألف مريض بالأدوية الفاعلة الجديدة منذ بدء العلاج في أكتوبر ٢٠١٤، ومصر تعتبر الدولة الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة



د. محمد علي عز العرب

السوفالدي مع الديكلتاسفير، وفي بعض الأحيان العلاج الثلاثي القديم «السوفالدي مع حقن الإنترفيرون طويل المفعول مع الريبافيرين» للحالات التي يناسبها حقن الإنترفيرون ولا يناسبها الأنواع السابقة،

أكد الدكتور محمد علي عز العرب أستاذ الكبد ورئيس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد أنه توجد ثلاثة بروتوكولات لعلاج فيروس «سى» على مستوى العالم وقواعد إرشادية صادرة من الجمعية الأمريكية للكبد والجمعية الأوروبية للكبد ومنظمة الصحة العالمية، وأن القواعد الإرشادية الصادرة من منظمة الصحة العالمية هي الأنسب للدول المتوسطة ومحدودة الدخل، وحسب توصيات المنظمة بالنسبة لتنوع الجيني الرابع أوصت بطريقتين مفضلتين في العلاج الأولى الهارفوني مع السوفالدي والديكلتاسفير، والطريقة الثانية خياران، الكوريفو مع الريبافيرين أو السوفالدي مع الأوسيو، وبالنسبة للجمعية الأمريكية للأمراض المعدية في ديسمبر ٢٠١٦ أوصت بالنسبة لتنوع الجيني الرابع أحد ثلاثة طرق لعلاج الكوريفو مع الريبافيرين أو زيباتير «لم يصل بعد لمصر» أو الهارفوني والطرق البديلة هي